



هر میلی لیتر از این محلول ها، حاوی ۵۰ میلی گرم سفتیوفور هیدروکلراید می باشد.

گاو: ۱-۲ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با ۱-۲ میلی لیتر از محلول استریل تزریقی برای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن، فقط به روش داخل عضلانی

جوجه یکروزه: ۰/۲ - ۰/۰۸ میلی گرم برای هر جوجه به مدت ۵ - ۳ روز فقط زیرجلدی، در گردن. یک میلی لیتر از محلول آماده شده برای ۶۲۵ - ۲۵۰ جوجه یکروزه می باشد.

موارد منع مصرف:

مصرف اکسنت® در حیواناتی که قبلاً به سفتیوفور یا سایر آنتی بیوتیک های گروه بتالاکتام افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است.

دوره پرهیز از مصرف:

گوشت: ۳ روز قبل از کشتار
شیر: ندارد

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت یخچال بین ۲ تا ۸ درجه سلیسیوس و دور از نور نگهداری شود. داروی آماده شده در دمای یخچال به مدت ۷ روز و در دمای اتاق تا ۱۲ ساعت نگهداری شود.

بسته بندی:

ویال ۱ و ۴ گرمی پودری

تولیدکننده:

شرکت سی تی سی بایو - کره جنوبی

ترکیب:

هر ویال شامل سفتیوفور سدیم (یک یا ۴ گرم) می باشد.

هر میلی لیتر از محلول آماده شده حاوی ۵۰ میلی گرم سفتیوفور می باشد.

مکانیسم اثر:

سفتیوفور یک سفالوسپورین باکتریسید با طیف اثر گسترده است که علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی که شامل سویه های تولیدکننده بتالاکتاماز نیز هستند عمل می کند.

موارد مصرف:

- درمان بیماری های تنفسی باکتریایی (تب حمل و نقل، پنومونی) ناشی از مانیهیما همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی
- درمان گنبدگی سم (نکروباسیلوز حاد بین انگشتی) ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و باکترئیدس ملانینوجنیکوس
- درمان ورم پستان

مقدار و نحوه مصرف:

روش آماده سازی:

ویال ۱ گرمی: با افزودن ۲۰ میلی لیتر آب استریل به داخل ویال محلول قابل تزریق آماده می شود.

ویال ۴ گرمی: با افزودن ۸۰ میلی لیتر آب استریل به داخل ویال محلول قابل تزریق آماده می شود.