

# Amoxoil retard

Amoxicillin  
Suspension for Injection

# آموکسویل ریتارد

آموکسی سیلین  
سوسپانسیون تزریقی



## زمان پرهیز از مصرف:

گوشته: ۵۰ روز

شیر: ۴ روز

## ترکیب:

۱۵۰ میلی گرم آموکسی سیلین در هر میلی لیتر

## موارد مصرف:

عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به آموکسی سیلین در گاو، گوسفند، سگ و گربه

## شرایط نگهداری:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.  
در دمای زیر ۳۰ درجه سلسیوس و دور از نور  
نگهداری شود.

## موارد منع مصرف:

حیواناتی که به آنتی بیوتیک های بتالاکتان حساسیت دارند.

## ماندگاری پس از اولین باز کردن ویال:

۲۸ روز

## عواض جانبی:

واکنش های آلرژیک از واکنش موضعی یا کهیر تا شوک آنافیلاکسی ممکن است رخ دهد.

## تولید کننده:

شرکت سیوا - اسپانیا

## תداخلات دارویی:

همراه با آنتی بیوتیک های باکتریواستاتیک تجویز نشود.

## مقدار و روش مصرف:

۱۵ میلی گرم آموکسی سیلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (معادل ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن)، با تزریق داخل عضلانی پیش از استفاده، خوب تکان داده شود.  
از تزریق داخل وریدی پرهیز شود.