

سالیسیلات سدیم

Sodium salicylate

متفرقه



زمان پرهیز از مصرف:
ندارد.

تداخل دارویی:
ندارد.

موارد احتیاط:
دوراز دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:
درجای خشک، زیر ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.
نگهداری دارو به مدت طولانی و در دمای کمتر از ۴ درجه سلسیوس منجر به افت کیفیت دارو می شود.

بسته بندی:
ظروف پلی اتیلنی ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی لیتری

ترکیب:

هر لیتر از محلول خوراکی حاوی ۴۸۶ گرم سالیسیلات سدیم خالص می باشد.

مکانیسم اثر:

سالیسیلات سدیم یک ضدالتهاب غیراستروئیدی بوده و دارای اثر ضدالتهاب، ضد درد و ضد تب می باشد. این دارو با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز موجب کاهش تولید پیش نیاز پروستاگلاندین ها می شود.

جذب این دارو سریع و کامل است و دارای متابولیسم کبدی و دفع کلیوی (به صورت کونژوگه یا تغییر نیافته ۱۱۳٪) می باشد. نیمه عمر دارو در مقادیر کم و یا با یک بار مصرف ۲-۳ ساعت و با مقادیر زیاد ۱۸-۵ ساعت می باشد.

موارد مصرف:

سالیسیلات سدیم برای درمان درد خفیف تا متوسط، تب و استوآرتریت استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور:

به عنوان ضد درد و ضد تب: ۲۰ میلی لیتر از دارو برای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده طیور (حدود ۵۰۰ میلی لیتر برای هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی) یک یا دو بار در روز برای کنترل پروستاگلاندین ها (اثر ضدالتهابی در بیماری های عفونی): ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلی لیتر از دارو برای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده (حدود ۳ لیتر از دارو برای هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی) یکبار در روز