



**سگ و گربه:** ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق عضلانی یا زیرجلدی.

**موارد احتیاط:**

واکنش های آنافیلاکتیک بخصوص در اسب ممکن است بعد از تزریق داخل رگی دارو رخ دهد، بنابراین تجویز وریدی به آرامی انجام شود و از محلول های رقیق کننده نظیر سرم قندی یا نمکی استفاده شود. محلول رقیق شده باید بلافاصله پس از تهیه تزریق گردد و در صورت مشاهده رسوب یا تغییر رنگ از تزریق آن خودداری گردد.

**شرایط نگهداری:**

دور از تابش نور مستقیم و دمای پایین تر از ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.  
از یخ زدگی محافظت شود.  
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

**بسته بندی:**

ویال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

**ترکیب:**

هر میلی لیتر از محلول حاوی:

- ویتامین B1 (تیامین) ۱۰ میلی گرم
- ویتامین B2 (ریبوفلاوین) ۴ میلی گرم
- ویتامین B6 (پیریدوکسین) ۴ میلی گرم
- ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) ۱۰ میکروگرم
- نیاسین آمید ۵۰ میلی گرم
- دکسپنتنول ۵ میلی گرم

**موارد مصرف:**

- در موارد بی اشتهاهی، کم خونی، دوره نقاهت بیماری ها، درمان بیماری های مزمن و اسهال
- در پیشگیری و کنترل علائم ناشی از کمبود ویتامین های گروه B
- در درمان نکرور کورتکس مغزی (Cerebrocortical)
- در درمان مسمومیت با سرخس در اسب ها
- در درمان یا پیشگیری از استرس (ایجاد شده بوسیله بیماری ها، حمل و نقل، دمای بالا یا تغییرات دمایی خیلی زیاد)
- بهبود ضریب تبدیل

**مقدار و نحوه مصرف:**

**اسب، گاو و گوساله:** ۳/۵ میلی لیتر به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق عضلانی یا داخل وریدی.

**گوسفند و بز:** ۱-۲ میلی لیتر به ازای هر ۳۰ کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق عضلانی یا داخل وریدی.