

# Betamox LA

Suspension for Injection

# بتاموکس طولانی اثر

سوسپانسیون برای تزریق

گاؤ ۴۵۰ کیلوگرمی  
گوسفند ۶۵ کیلوگرمی  
سگ ۲۰ کیلوگرمی  
گره ۵ کیلوگرمی  
۴۵ میلی لیتر  
۶/۵ میلی لیتر  
۲ میلی لیتر  
۰/۵ میلی لیتر

به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن، یک میلی لیتر از دارو بایستی تزریق شود. چنانچه مقادیر دارو بیش از ۲۰ میلی لیتر شود، دوز از محاسبه شده بایستی در دو ناحیه مجزا تزریق شود. مانند سایر داروهای تزریقی، ملاحظات آسپتیک را بایستی مدنظر قرار داد. از سرنگ های مدرج جهت تزریق مقادیر درست دارو استفاده نماید. این مورد خصوصاً در مواردی که مقادیر دارو کم است حائز اهمیت می باشد.

## دوره پرهیز از مصرف

طی دوره درمان، از شیر گاو برای مصرف انسان استفاده نشود. در گاوهایی که دو بار دوشیده می شوند، از ۷۹ ساعت پس از آخرین تزریق (یعنی پس از ۷ بار دوشش) می توان شیر این حیوانات را برای مصرف انسان ارسال کرد. چنانچه گاو سه بار در روز دوشیده می شود، می بایست حداقل زمان قید شده (یعنی ۷۹ ساعت) جهت مصرف شیر برای انسان را منظور کرد یعنی پس از دهمین دوشش می توان شیر را برای مصارف انسانی ارسال کرد.

## گوشت گاو: ۳۳ روز پس از آخرین تزریق

## گوشت گوسفند: ۱۶ روز پس از آخرین تزریق

در گوسفندانی که شیر آنها مصرف انسانی دارد نباید مورد مصرف قرار گیرد.

## موارد احتیاط

استفاده از این محصول منوط به انجام آزمایش حساسیت میکروبی (آنتی بیوگرام) باکتری های جدا شده از حیوانات می باشد. در صورتی که امکان انجام این آزمایش نباشد، درمان بایستی براساس اطلاعات اپیدمیولوژیک منطقه صورت پذیرد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

## تداخل دارویی و ملاحظات

این محصول را نمی توان جهت تزریق داخل وریدی یا داخل نخاعی به کار برد. همچنین این آنتی بیوتیک را نباید در خرگوش، همستر و خوکچه هندی بکار برد.

در حیواناتی که حساسیت به پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها دارند، منع مصرف دارد.

در بعضی موارد در محل تزریق ممکن است واکنش های بافتی موضعی دیده شود.

در فرد تزریق کننده در صورتی که به آن حساسیت داشته باشد می تواند واکنش ایجاد کند.

## شرایط نگهداری

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سلسیوس نگهداری کنید.

## بسته بندی

ویال شیشه ای بدون رنگ ۱۰۰ میلی لیتری

تولیدکننده: شرکت نوربروک - ایرلند



ترکیب: هر میلی لیتر حاوی:  
آموکسی سیلین ۱۵۰ میلی گرم  
موارد کاربرد

در شرایط آزمایشگاهی آموکسی سیلین بر روی طیف گسترده ای از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت موثر است که از جمله موارد زیر را می توان نام برد:  
اشریشیا کلای، کلبسیلا پنومونیه، گونه های پروتوسه، گونه های سالمونلا، استرپتوکوک ها و استافیلوکوک ها. این دارو در برابر میکروب های تولیدکننده بتالاکتاماز موثر نمی باشد. این آنتی بیوتیک برای کنترل میکروب های حساس در گاو، گوسفند، سگ و گربه به کار می رود که با یک دوز تزریق، اثرات موثر دارو ظاهر خواهد شد. همچنین جهت پیشگیری از بروز عفونت ثانویه باکتریایی قابلیت مصرف دارد.

## مهمترین موارد مصرف این دارو در عفونت های ذیل می باشد:

(الف) دستگاه گوارش

(ب) دستگاه تنفس

(ج) پوست و بافت های نرم

(و) دستگاه ادراری

(ه) پیشگیری از عفونت های پس از عمل جراحی (قبل از عمل دارو را تزریق کنید)

## مقدار و نحوه مصرف

جهت اطمینان خاطر از تزریق دوز صحیح، وزن کشتی حیوان قبل از تزریق توصیه می شود تا از تزریق دوزهای پایین جلوگیری شود.

گاو و گوسفند: فقط تزریق عضلانی

سگ و گربه: تزریق زیر پوستی یا داخل عضلانی

دوز توصیه شده ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. در صورت نیاز ۴۸ ساعت بعد قابل تکرار می باشد. محل تزریق را به آرامی ماساژ دهید.

قبل از مصرف شیشه را تکان دهید. قبل از برداشت دارو از داخل ویال در دفعات بعد، پوشش پلاستیکی روی ویال را تمیز و ضد عفونی نمایید. از سرنگ و سرسوزن های استریل استفاده نمایید. در صورت تعدد تزریقات توصیه می شود تزریق در محل دیگری صورت پذیرد.

مقادیر دارو براساس وزن بدن حیوان