



#### خصوصیات واکسن:

واکسن باید به میزان ۰/۵ میلی لیتر در عضله سینه پالت تخمگذار یا مرغ های مادر در زمان پرورش تزریق گردد.  
اولین واکسیناسیون در سن ۶ تا ۸ هفتگی و بوستر آن ۴ هفته قبل از شروع تخمگذاری توصیه می شود.

کوری وک ۳ از سویه های شدیداً محرک ایمنی متعلق به سروتیپ های A, B, C و C باکتری هموفیلوس پاراگالیناروم به شکل غیر فعال شده با فرمالین تهیه می شود.  
کشت های باکتری در روغن مینرال سبک به صورت امولسیون در آمده تا شدت و طول ایمنی زایی را افزایش دهند.

#### ترکیب واکسن:

**توجه:** قبل از انجام تزریق، ویال واکسن را در خارج از یخچال قرار داده تا به درجه حرارت معمولی اتاق برسد. قبل از استفاده، ویال واکسن ها را کاملاً تکان دهید. بعد از اولین استفاده، محتویات ویال باید طی ۲۴ ساعت مورد مصرف قرار گیرد.

هر دوز واکسن (۰/۵ میلی لیتر) حاوی:

هموفیلوس پاراگالیناروم غیر فعال سروتیپ A:  $3 \times 10^9$  CFU

هموفیلوس پاراگالیناروم غیر فعال سروتیپ B:  $3 \times 10^9$  CFU

هموفیلوس پاراگالیناروم غیر فعال سروتیپ C:  $3 \times 10^9$  CFU

#### موارد مصرف:

**شرایط نگهداری:**  
در درجه حرارت ۲ تا ۸ درجه سلسیوس نگهداری شود.  
**عمر قفسه ای:**  
۲۴ ماه

پیشگیری از بیماری کوریزای عفونی طیور

#### میزان و نحوه مصرف:

**بسته بندی:**  
ویال های ۲۵۰ میلی لیتری (۵۰۰ دوزی)  
ویال های ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دوزی)

ایمنی مناسبی پس از تزریق اولین واکسن در بدن پرنده ایجاد می شود، با این حال متعاقب واکسن دوم ایمنی قوی تر و با دوام طولانی تر در پرنده ایجاد خواهد شد.

#### تولیدکننده:

شرکت فاترو - ایتالیا