

Calciject 40 CM

Solution for Injection

کلسی جکت ۴۰ سی ام

محلول برای تزریق



ترکیب

تزریق های داخل وریدی بایستی به آهستگی صورت پذیرند تا از بروز عوارض عصبی - اسکلتی یا قلبی جلوگیری به عمل آید. شرایط آسپتیک حین تزریق بایستی رعایت شود. پس از تزریق زیر پوستی، محل تزریق باید به آرامی ماساژ داده شود.

این محصول حاوی مواد نگهدارنده ضد میکروبی نمی باشد.

داروی باقیمانده در فلاکن (پس از خارج نمودن مقادیر مورد نیاز محلول) بایستی دور ریخته شود. حین مصرف دارو مراقب تزریق به خود باشید زیرا ممکن است در محل تزریق عوارض تحریک دیده شود.

محلول مصرف نشده و فلاکن خالی را باید بر اساس قوانین زیست محیطی کشور مربوطه دفع نمود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری

در حرارت بالای ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری نشود.

بسته بندی

فلاکن ۴۰۰ میلی لیتری

تولیدکننده:

شرکت نور بروک - ایرلند

هر میلی لیتر حاوی:

بروگلوکونات کلسیم ۴۰۰ میلی گرم

منیزیم هیپوفسفیت هگزا هیدرات

۵۰ میلی گرم

هر ۴۰۰ میلی لیتر از این محصول حاوی مقادیر ذیل می باشند:

کلسیم (به صورت گلوکونات کلسیم و بروگلوکونات کلسیم) ۱۱/۹ گرم

منیزیم (به صورت هیپوفسفیت منیزیم)

۱/۸۵ گرم

اسید بوریک ۶/۸۴ درصد وزن حجمی

موارد کاربرد

کلسی جکت ۴۰ سی ام جهت درمان هیپوکالسمی به کار می رود. با تزریق این محلول میزان منیزیم خون نیز افزایش خواهد یافت.

مقدار و نحوه مصرف

تزریق بایستی به شکل زیر پوستی یا به آهستگی داخل ورید صورت پذیرد. گاو: ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی لیتر

دوره پرهیز از مصرف

گوشت یا شیر گاو: ندارد.

موارد احتیاط

قبل از تزریق محلول تزریقی را گرم نموده تا حرارت آن به درجه حرارت بدن نزدیک گردد.