

ستری وت سی®

Cetrivet C®

ROOYAN
DAROU

محلول ضد عفونی کننده

Disinfectant Solution

ستریماید + کلر هگزیدین

Cetrimide + Chlorhexidine

ضد عفونی کننده و شوینده



نسبت ۱ به ۳۰ لیتر و برای شستشو و ضد عفونی دست‌ها پیش از انجام عمل جراحی به نسبت ۱ به ۵ با الکل ۷۰ درصد رقیق شود.

موارد احتیاط:

در مواردی که لوازم فلزی بیش از ۸ ساعت در محلول ستریماید + کلر هگزیدین باقی بمانند، افزودن نیتريت سدیم ۴ درصد به منظور جلوگیری از تغییرات ظاهری آنها و تعویض محلول، هفته‌ای یک بار توصیه می‌شود. باید توجه نمود استفاده از محلول ضد عفونی کننده ستریماید + کلر هگزیدین همیشه با توجه به موارد و غلظت توصیه شده باشد.

از تماس پوست و به خصوص مخاط داخلی مانند چشم و گوش میانی با ستریماید + کلر هگزیدین غلیظ اجتناب شود.

از قراردادن اشیاء و وسایل لاستیکی در ستریماید + کلر هگزیدین غلیظ خودداری شود.

سرنگ و سوزن‌هایی که با ستریماید + کلر هگزیدین غلیظ گذردایی می‌شوند پیش از استفاده با آب یا سرم فیزیولوژی شسته شوند.

برای خنثی کردن اثر تحریکی ستریماید + کلر هگزیدین در موارد بلغ اتفاقی، از مایعات صابونی رقیق استفاده شود.

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه سلسیوس) و داخل ظروف مناسب نگهداری شود.

دور از دسترس کودکان قرار داده شود.

بسته بندی:

ظروف ۱ و ۴ لیتری

ترکیب:

حاوی دو ماده ضد عفونی کننده و پاک کننده زیر است:

ستریماید ۱۵٪ وزن در حجم

کلر هگزیدین گلوکونات ۱/۵٪ وزن در حجم

موارد مصرف:

ستریماید + کلر هگزیدین به دلیل خاصیت ضد عفونی کنندگی و پاک کنندگی فوق العاده ترکیبات آن، قادر به تاثیر روی میکروب‌های گرم مثبت و گرم منفی از قبیل انواع کلی باسیل‌ها، سالمونلاها، استریتوکوک‌ها، استافیلوکوک‌ها، برخی قارچ‌ها و ویروس‌های بیماری‌زای دام و طیور در غلظت تعیین شده می‌باشد.

محلول ستریماید + کلر هگزیدین با طیف وسیع اثر برای شستشو و ضد عفونی پوست و محل عمل جراحی، رحم، پستان، زخم، دست، البسه، ظروف و وسایل شیردوشی، فضا و لوازم دامداری و مرغداری، لوازم و وسایل جراحی در غلظت‌های مناسب تعیین شده، با اطمینان کامل از تاثیر مطلوب آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

در موارد مختلف برای گندزدایی کف، دیوار، ظروف غذا و آبجوی، سایر لوازم مرغداری و دامداری، شستشوی دست قبل و بعد از کار، ایجاد شرایط مناسب برای اعمال جراحی کوچک و زایمان، شستشوی زخم‌های واجد آلودگی شدید، ضد عفونی کردن چکمه و لباس کار، نگهداری لوازم استریل شده و شستشوی لوازم جراحی به نسبت حجمی ۱ به ۲۰۰ لیتر آب (در مورد لوازم جراحی ترجیحاً با آب مقطر) رقیق شود.

برای ضد عفونی کامل و سریع پوست و لوازم جراحی به