

ChickVac™

Injectable vaccine

چیک وک®

واکسن تزریقی



کردن واکسن استفاده نمایید.
- فقط پرندگان سالم را واکسینه نمایید.
- از واکسینه کردن پرندگان حین تولید
جلوگیری شود.
- تا یک ساعت پس از اضافه کردن حلال به
واکسن، کل محتویات ویال (۱۰۰۰ دوز) را مصرف
نمایید.

- از قراردادن واکسن در کنار حرارت خودداری
به عمل آید. در معرض نور مستقیم خورشید
قرارداده نشود.

- پس از باز شدن ویال واکسن، کل محتویات
واکسن در آنزمان بایستی مورد مصرف قرار
گیرد.

- ویال واکسن و محتویات آن را که مورد مصرف
واقع نشده اند، بسوزانید.

- واکسن را بر اساس قوانین رایج در کشور
خود مصرف نمایید.

موارد منع مصرف:

چنانچه بر اساس دستور العمل‌های توصیه شده
مصرف شود، هیچگونه منع مصرفی ندارد.

هشدارها:

- چنانچه این واکسن در سن یک روزگی مصرف
شود، ممکن است اندکی از کارایی واکسن مارک
کاسته شود.

- فقط در مناطقی که مجاز می‌باشد، مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

واکسن در حرارت زیر ۷ درجه سلسیوس
نگهداری شود.

حلال در حرارت زیر ۲۷ درجه سلسیوس
نگهداری شود.

بسته بندی:

هر بسته حاوی ۱۰ ویال هزار دوزی

تولیدکننده:

شرکت زونتیس - آمریکا

چیک وک® یک واکسن زنده ویروسی جهت
ایمن کردن ماکیان علیه آرتزیت ویروسی
(تنوسایونیت) می‌باشد.

ترکیب:

رئو ویروس زنده سویه ۱۱۳۳
از جنتامایسین و آمفوتریسین B به عنوان
نگهدارنده در این واکسن استفاده شده است.

فرمولاسیون:

واکسن زنده رئوویروس لیوفیلیز شده

حیوان هدف:

ماکیان

موارد مصرف:

حفاظت جوجه‌های ۱ تا ۱۰ روزه سالم علیه آرتزیت
ویروسی (تنوسایونیت)

برنامه واکسیناسیون:

واکسن باید در جوجه‌های یک تا ۱۰ روزه به
شکل زیرپوستی در ناحیه پشت گردن تزریق
شود تا ایمنی در برابر آرتزیت ویروسی
(تنوسایونیت) ایجاد گردد.

دوز مصرف:

یک دوز (۰/۲ میلی‌لیتر) به ازای هر پرنده

روش مصرف:

تزریق زیرپوستی: جهت دستیابی به اطلاعات
بیشتر به بروشور واکسن مراجعه نمایید.

دوره پرهیز از مصرف:

۲۱ روز قبل از کشتار

موارد احتیاط:

- از حلال زونتیس یا نرمال سالین جهت حل