



**۵- جهت درمان بیماری تاج آبی ناشی از عوامل باکتریایی:**

۱۱۰ میلی گرم پرمیکس کلر تتراسین رویان® به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به مدت ۱ هفته

**۶- جهت درمان ساپنوویت عفونی ناشی از Mycoplasma synoviae در بوقلمون:**

۴۰۰ گرم محصول در هر تن دان به مدت ۱ هفته

**زمان پرهیز از مصرف:**

در طیور گوشتی ۳ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد و در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

**تداخل دارویی:**

۱- در مصرف خوراکی تتراسایکلین ها با آنتی اسیدهای خوراکی و سایر فرآورده هایی که حاوی کاتیون های دو و سه ظرفیتی شلات کننده (آلومینیوم، کلسیم، منیزیم، روی یا بیسموت) می باشند، تداخل ایجاد می شود.  
۲- فرآورده های آهن خوراکی باعث کاهش جذب تتراسایکلین ها می شوند و سدیم بی کربنات خوراکی، کائولین، پکتین یا بیسموت ساب سالیسیلات در مصرف همزمان با تتراسایکلین ها باعث اختلال در جذب آنها می شوند.

۳- در مصرف همزمان داروهای باکتریو استاتیک (تتراسایکلین ها) و داروهای باکتریسید (پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و ...) و آمینوگلیکوزیدها تداخل ایجاد می گردد.

**موارد احتیاط:**

هنگام مخلوط کردن این دارو از پوشش حفاظتی مانند دستکش و ماسک استفاده شود.  
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

**شرایط نگهداری:**

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

**بسته بندی:**

پاکت های ۱ و ۵ کیلوگرمی

**ترکیب:**

هر کیلوگرم دارو حاوی ۵۰۰ گرم کلر تتراسایکلین خالص (ملح هیدروکلراید) می باشد.

**مکانیسم اثر:**

این دارو سنتز پروتئین را در باکتری به وسیله باند شدن به تحت واحد ۳۰S ریبوزوم مختل می کند.

**موارد مصرف:**

آنتی بیوتیکی وسیع الطیف می باشد که علیه باکتری های هوازی و بی هوازی گرم مثبت و گرم منفی، میکوپلاسماها، ریکتزیاها، کلامیدیاها و بعضی پروتوزوآها مؤثر است.

**مقدار و نحوه مصرف:**

۱- جهت درمان ساپنوویت عفونی و وبای طیور:  
۴۰۰ - ۲۰۰ گرم پرمیکس کلر تتراسین رویان® در هر تن دان به مدت ۱ هفته

۲- جهت درمان CRD و التهاب کیسه های هوایی:

۸۰۰ گرم پرمیکس کلر تتراسین رویان® در هر تن دان به مدت ۱ هفته

۳- جهت کاهش مرگ و میر ناشی از التهاب کیسه های هوایی با عامل E.Coli:

۱۰۰۰ گرم پرمیکس کلر تتراسین رویان® در هر تن دان به مدت ۵ روز

۴- جهت درمان هگزامیتیاژیس در بوقلمون:

۴۰۰ گرم پرمیکس کلر تتراسین رویان® در هر تن دان به مدت ۱ هفته