

کوکسی زاین®



ROOYAN  
DAROU

Coccizine®

بودر قابل حل در آب

Water Soluble Powder

سولفاکلوزاین ۳۰٪

Sulfaclozine 30%

ضد کوکسیدیوز



۷ و ۹ و یا با ترتیب دیگری در روزهای ۱، ۲، ۵ و در صورت ضرورت روزهای ۶ و ۹ در اختیار طیور قرار دهید. در واحدی که شیوع کوکسیدیوز غالباً مشاهده می شود برنامه خوراندن سولفاکلوزاین به مدت ۲ تا ۳ روز پشت سر هم در سومین و پنجمین هفته زندگی جوجه ها توصیه می شود. مقدار داروی داخل دان ۲۰ ساشه ۱۰۰ گرمی در یک تن دان است.

### زمان پرهیز از مصرف:

۱- نیمچه گوشتی: ۱۴ روز

۲- مرغ تخمگذار: ۱۱ روز برای تخم مرغ

۳- بوقلمون: ۱۴ روز

### موارد احتیاط:

با وجود قابلیت تحمل سولفاکلوزاین در طیور، احتمال بروز خون ریزی در جوجه ها که معمولاً پس از مصرف سولفانامیدها دیده می شود، وجود دارد. بنابراین لازم است از خوراندن بیش از میزان توصیه شده از سولفاکلوزاین اجتناب شود. در صورت بروز خون ریزی باید با افزودن ویتامین K به جیره طیور نسبت به رفع این مشکل اقدام گردد.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

### شرایط نگهداری:

در محل خشک، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و به دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت نگهداری شود.

### بسته بندی:

ساشه ۱۰۰ گرمی

### ترکیب:

هر گرم بودر حاوی ۳۰۰ میلی گرم سولفاکلوزاین (ملح سدیم مونوهیدرات) می باشد.

### مکانیسم اثر:

این سولفونامید وسیع الطیف با پارا آمینو بنزوئیک اسید (PABA) تبدیل شونده به اسید فولیک آنتا گونیسم دارد در حالی که اسید فولیک برای بقای زندگی کوکسیدیا ها و باکتری ها کاملاً ضروری است.

### موارد مصرف:

این دارو برای درمان کوکسیدیوز ناشی از ایمریاهای مختلف شامل ایمریا نکاتریکس، ماکسیما، آسروولینا، برونٹی، تتلا، پاراکوکس، آدنوئیدس، مله آگرمیتیس و سالمونلوز ناشی از سالمونلاگالیناروم، پولوروم، انتریتیدیس، تیفی موربوم و پاستورلوز (وبای طیور) موثر است.

### مقدار و نحوه مصرف:

این بودر به صورت خوراکی و از طریق آب آشامیدنی یا همراه غذا تجویز می شود.

در طیور دو روش زیر توصیه می گردد:

۱- **درمان عادی کوکسیدیوز:** روزانه ۱۰۰-۵۰ میلی گرم سولفاکلوزاین برای هر کیلوگرم وزن بدن یا یک ساشه ۱۰۰ گرمی در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ روز متوالی در اختیار طیور قرار گیرد. در موارد ایمریاتتلا و ایمریانکاتریکس مقدار درمانی را به یک ساشه ۱۰۰ گرمی در ۵۰ لیتر آب آشامیدنی افزایش دهید.

۲- **درمان متناوب کوکسیدیوز:** در این حالت یک ساشه ۱۰۰ گرمی را در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی حل کرده و در روزهای ۱، ۳ و ۵ و چنانچه ضروری باشد روزهای