

# دی - کلوپسی جی

D-Clo PG®

دی - کلوبروستنول سدیم  
D-Cloprostetol sodium



محلول استریل تزریقی  
Injectable solution

ROOYAN  
DAROU



تهییه شده از مواد اولیه شرکت

دوهی



## مقدار و نحوه مصرف:

این دارو به صورت تزریق عضلانی مصرف می شود.  
گاو: ۲ میلی لیتر  
اسب: ۱ میلی لیتر

## زمان پرهیز از مصرف:

زمان دفع دارو از طریق شیر ۳ ساعت و در گوشت و سایر بافت ها ۲۴ ساعت بعد از آخرین تزریق می باشد.

## موارد احتیاط:

در درمان پیومتر در صورت بسته بودن گردن رحم با احتیاط مصرف گردد زیرا احتمال بریتوئیت در اثر پارگی رحم وجود دارد.

PGF<sub>2α</sub> از راه پوستی قابل جذب می باشد لذا هنگام استفاده از آن توسط زنان باردار و مبتلا به آسم به دلیل

ایجاد اسپاسم در برونش ها دقت شود.

در صورت تماس، موضع با آب و صابون شستشو داده شده و از داروهای بازکننده برونش استفاده گردد.  
در اسب امکان تعریق، افزایش ضربان قلب و درد شکم وجود دارد.

انتظار می رود این دسته داروها در حیوانات دارای جسم زرد فعال موثر باشند.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

## شرایط نگهداری:

دارو در دمای بین ۱۵-۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

## بسته بندی:

ویال های ۱۰ و ۲۰ میلی لیتری

## تزریق:

هر میلی لیتر حاوی ۰/۰۷۵ میلی گرم دی - کلوبروستنول سدیم می باشد.

## مکانیسم اثر:

دی - کلوبروستنول سدیم آنالوگ سنتیک پروستاگلاندین F2<sub>α</sub> بوده و دارای کلیه اثرات آن می باشد. این دارو باعث انقباض میومتر و شل شدن گردن رحم و کاهش حجم رحم گردیده و در صورت تماس با جسم زرد بالغ باعث تحلیل آن از نظر علمی و مورفوژیک می شود.  
(این عمل باعث فحلی دام در فاصله زمانی ۲-۵ روز بعد از تزریق می شود).

## موارد مصرف:

این دارو در اسب و گاو قابل مصرف می باشد.

این دارو در گاو در موارد زیر مورد مصرف قرار می گیرد:

- تحلیل جسم زرد و متعاقب آن تخمک گذاری و بروز فحلی در گاوهای شیری غیر آبستن با تخدمان فعال

- استفاده در برنامه های همزمان سازی فحلی به همراه آنالوگ های GnRH

- تومور تخمدانی مزمن و یا کیست های لوთال تخمدان

- انلومتریت

- افزایش قدرت انقباض میومتر رحم

- القای سقط و اتمام آبستنی

- غفونت های رحمی

- ناراحتی و بیماری های رحمی بعد از زایمان

- موارد فحلی خاموش Silent heat