

# DOXMAY

Doxycycline (hyclate)  
Oral Solution

# داکس مای

داکسی سایکلین (هایکلیت)  
محلول خوراکی



## ترکیب:

داکسی سایکلین (هایکلیت) ۱۰۰ میلی گرم  
مواد حامل ۱۰ میلی لیتر

در طیور تخمگذار مصرف نشود.  
همزمان با آنتی اسیدها، کائولن، ترکیبات آهن دار و یا مقادیر زیادی کلسیم، آهن، منیزیم و آلومینیوم در جیره غذایی، مصرف نشود.

## موارد مصرف و حیوان هدف:

درمان CRD، میکوپلاسموز، ویای طیور و کلی باسیلوز ناشی از اجرام حساس به داکسی سایکلین در طیور

**دوره پرهیز از مصرف: گوشت:**  
۷ روز

## شرایط نگهداری:

در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری شود.  
ظرف دارو را قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.  
دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

## بسته بندی:

بطری ۱ لیتری

## تولیدکننده:

شرکت داروسازی رویان دارو  
تحت لیسانس کمپانی MAYMO اسپانیا

## مقدار و روش مصرف:

خوراکی از راه آب آشامیدنی ۲۰-۱۰ میلی گرم  
داکسی سایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  
در روز به مدت ۳-۵ روز متوالی (معادل ۱-۰/۵ میلی لیتر دارو در هر لیتر آب آشامیدنی) آب حاوی دارو باید تنها منبع آب آشامیدنی در دوره درمان طیور باشد. آب حاوی دارو را باید هر ۲۴ ساعت تهیه نمود. در آب های قلیایی مصرف اسیدیفایرهای آب قبل از استعمال این دارو در آب توصیه می شود.

## موارد عدم مصرف:

در صورت وجود حساسیت به تتراسیکلین ها مصرف نشود.  
در حیوانات دارای نارسایی کبدی مصرف نشود.  
در حیوانات آبستن یا شیروار مصرف نشود.