

Deccox®
Decoquinat 6%
Premix

دکوکس®

دکوکینات ۶٪
پیش مخلوط



قابلیت مصرف همزمان:

مصرف همزمان با زینک با سیترا سین، کلرتترا سایلکین و با سیترا سین متیلن دی سالیسیلات مورد تأیید می باشد.

نگهداری و بسته بندی:

در یک محل محفوظ و به دور از حرارت نگهداری شود.

جهت جلوگیری از آلوده شدن محصول، از قرار دادن دکوکس® در محیط باز خودداری نمایید. دکوکس® در کیسه های چند لایه ۱۰ کیلوگرمی همراه با یک لایه محافظ به بازار عرضه می گردد.

موارد احتیاط:

- در مرغ های تخمگذار نباید تجویز گردد.
- در جیره های غذایی که حاوی بنتوتیت هستند، توصیه نمی شود.

گونه هدف:

طیور گوشتی

دوز مصرف:

۲۰ تا ۴۰ گرم دکوکینات خالص در هر تن جیره نهایی معادل ۳۳۳۳ تا ۶۶۶۶ گرم دکوکس® در هر تن دان (دوز میانگین موثر برابر با ۵۰۰ گرم دکوکس® در هر تن دان می باشد) که به صورت مداوم بایستی داخل دان طیور وجود داشته باشد.

برنامه پیشنهادی:

۴/۵ ماه در برنامه شاتل و ۳ ماه در برنامه پیشگیری یکسره (Full Programme)

دوره پرهیز از مصرف:

ندارد.

تاریخ مصرف:

۳ سال از تاریخ تولید

تولیدکننده:

شرکت زونتیس - انگلستان

دکوکس® جهت پیشگیری از کوکسیدیوز در طیور به کار می رود. هر کیلو گرم دکوکس حاوی ۶۰ گرم (۶٪) دکوکینات می باشد.

موارد مصرف:

جهت کنترل کوکسیدیوز ناشی از آیمیریا تنلا، آیمیریا نکاتریکس، آیمیریا آسرو لینا، آیمیریا میواته، آیمیریا ماگزیمبا و آیمیریا بروتتی در طیور صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نکات کلیدی:

- کاملاً بی خطر و ارجح نسبت به سایر کوکسیدو-استات های شیمیایی که عملکرد کبد را تحت تاثیر قرار داده و بعضاً موجب تلفات به خاطر استرس های حرارتی می شوند.

- دکوکس® کوکسیدو استات شیمیایی است که با اثر فوق العاده خود از بروز کوکسیدیوز در نیمچه های گوشتی جلوگیری به عمل می آورد. - داروی غیر آنتی بیوتیک وسیع الطیفی که در مراحل اولیه رشد کوکسیدیا موجب نابودی آن ها می شود.

- استفاده از دکوکس® یک بار در سال به صورت CLEAN UP باعث بهبود عملکرد حداکثری در پرندگان می شود.

- قابلیت استفاده در برنامه های چرخشی کنترل کوکسیدیوز.

- قابلیت مصرف در تمام دوره پرورش با دوز از متغیر.