

دگزاوت®

Dexa Vet®



ROOYAN
DAROU

محلول استریل تزریقی
Injectable solution

دگزامتازون ۰/۲٪

Dexamethasone 0.2%

ضد التهاب



سگ: ۱-۰/۲۵ میلی لیتر
گربه: ۰/۲۵-۰/۵ میلی لیتر

زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: ۳ روز
شیر: ۱ روز

موارد احتیاط:

این دارو در مواقع وجود عفونت بدون استفاده از آنتی بیوتیک نباید مورد استفاده قرار گیرد.
در سه ماه آخر آبستنی در گاو استفاده نگردد زیرا احتمال سخت زایی و یا سقط جنین را افزایش می دهد.
از این دارو همراه سایر داروهای ضدالتهابی غیراستروئید استفاده نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای ۱۵-۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ویال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی ۲/۶۳ میلی گرم دگزامتازون به صورت فسفات سدیم معادل ۲ میلی گرم دگزامتازون می باشد.

مکانیسم اثر:

مانند سایر گلوکوکورتیکوئیدها مانع تجمع سلول های التهابی از جمله ماکروفاژها و لوکوسیت ها در محل التهاب شده و از فاگوسیتوز و آزاد شدن آنزیم های لیزوزومی جلوگیری می کند و بدون تاثیر بر علل التهاب باعث کاهش واکنش های بافتی در روند التهاب می شود.
مزیت اصلی و مهم این دارو به انواع مشابه نظیر بتامتازون توانایی عبور آن از سد خونی مغز می باشد.

موارد مصرف:

- کتوز گاو (استونمی)
- حالات شوک و استرس
- آرتریت های غیر عفونی، تاندونیت، استئوآرتریت التهاب و تر و سینوویال های وتری
- واژینیت
- سندرم آمفیژم رویی گاو
- پنومونی آتیبیک در گاو

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو به شکل عضلانی، داخل وریدی، زیر جلدی و داخل مفصلی مورداستفاده قرار می گیرد.

اسب و گاو: ۵ میلی لیتر
گوساله، گوسفند و بز: ۱-۲/۵ میلی لیتر