

# Diacef دیاسف

Suspension for Injection

سوسپانسیون تزریقی



در صورت وجود حساسیت به این دارو و یا محصولات مشابه از دست زدن به این دارو خودداری کنید و از تماس چشم ها و پوست با این دارو جلوگیری شود.

## میزان و نحوه مصرف:

گاؤ:

بصورت زیر پوستی تجویز شود.

در بیماری تنفسی ۱ میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برابر با ۱ میلی لیتر از دارو به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن) به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی در نکرولباسیلوز بین انگشتی حاد ۱ میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برابر با ۱ میلی لیتر از دارو به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن) به مدت ۳ روز متریت حاد بعد از زایمان ۱ میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برابر با ۱ میلی لیتر از دارو به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن) به مدت ۵ روز که در بعضی موارد حاد ممکن است درمان حمایتی مورد نیاز باشد.

قبل از مصرف تکان دهید.

## عوارض جانبی:

واکنش های ازدیاد حساسیت غیر مرتبط با دز می تواند رخ دهد.

در گاؤ التهاب مزمن موضعی بصورت خفیف تا متوسط مشاهده شده است.

## تداخلات دارویی:

با ماکرولیدها ، سولفونامیدها و تتراسایکلین ها تجویز نشود.

## دوره منع مصرف:

گاؤ:

گوشت و احشا: ۶ روز

شیر: ندارد

## شرایط نگهداری:

در جای خشک دور از نور در دمای زیر ۳۰ درجه سلسیوس نگهداری شود.

## بسته بندی:

ویال ۱۰۰ میلی لیتر

## تولید کننده:

شرکت سوپرز دیانا- اسپانیا

## ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی ۵۰ میلی گرم سفتیوفور هیدرو کلراید می باشد.

سفتیوفور، سفالوسپورین نسل سوم می باشد که علیه تعداد زیادی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت موثر است. سفتیوفور سنتز دیواره سلولی باکتری را مهار کرده در نتیجه خصوصیات باکتریسیدال خود را اعمال می کند.

## موارد مصرف:

گاؤ:

درمان بیماری های تنفسی باکتریایی ناشی از پاستورلا- مولتوسیدا، مانهیمیا همولایتیکا، هیستوفیلوس سومی در مان گندیدگی حاد سم در گاؤ ( نکرولباسیلوز بین انگشتی) ناشی از فوزوباکتریوم نکروروم و پورفیرو- موناس آژاکارولیتیکا

درمان متریت حاد بعد از زایمان در گاؤ ناشی از ای کولای، تروپرلا پایوژن و فوزوباکتریوم نکروروم حساس به سفتیوفور در مواقعی که درمان با سایر آنتی بیوتیک ها موفق نبوده است.

## موارد منع مصرف:

در موارد افزایش حساسیت به ماده فعال یا سایر آنتی بیوتیک های بتا لاکتام و یا هر کدام از اکسپینت ها، استفاده نشود.

بصورت داخل رگی استفاده نشود.

در طیور به علت خطر انتشار مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان ها استفاده نشود.

## موارد احتیاط ویژه:

برای اطمینان از تجویز دز صحیح، وزن بدن باید تا آنجا که ممکن است بصورت دقیق محاسبه شود تا از تجویز کمتر از میزان لازم جلوگیری شود.