

دایجستوسیا

منبوتون
محلول تزریقی

Digestosyva

Menbutone
Solution for Injection



ترکیب:

(حداقل در طول ۱ دقیقه).
در موارد لازم می توان تزریق را ۲۴ یا ۴۸ ساعت
بعد تکرار کرد.

۱۰۰ میلی گرم منبوتون در هر میلی لیتر

موارد مصرف:

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۲ روز
شیر: ۲ روز

بهبود عملکرد دستگاه گوارش و تحریک ترشحات
گوارشی در سوءهاضمه، توکسمی، گتوز، بی اشتها،
نارسایی کبد و پانکراس در گاو

شرایط نگهداری:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.

موارد منع مصرف:

حیواناتی که دچار اختلالات قلبی، هایپرترمی یا
انسداد مجرای صفراوی هستند، تجویز نشود.
در ۳ ماه آخر آبستنی و در گاو های شیرده مصرف
نشود.

ماندگاری پس از اولین باز کردن ویال:

۲۸ روز

عوارض جانبی:

بسته بندی:

ویال ۱۰۰ میلی لیتری

تزریق داخل وریدی سریع سبب لرزش بدن، تنفس
سریع، بی اختیاری در دفع مدفوع، سرفه، عطسه،
ریزش اشک و افتادن حیوان می شود.

تولید کننده:

شرکت سیوا- اسپانیا

تداخلات دارویی:

همراه با محلول هایی که حاوی کلسیم، پنی سیلین
یا ویتامین های گروه B هستند، تزریق نشود.

مقدار و روش مصرف:

۱۰ میلی گرم منبوتون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
(معادل ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن).
با تزریق داخل عضلانی یا داخل وریدی آهسته

