



ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی ۷۰ میلی گرم دیمینازن استوریت می باشد.

مکانیسم اثر:

دیمینازن جهت درمان شیمیایی تریپانوزوما موثر می باشد. این دارو به صورت غیر قابل برگشت بر روی چرخه زندگی پیرو پلازما موثر است و در موارد نادر در بعضی از گونه ها یک تزریق کافی نبوده و درمان باید بعد از ۱۲-۲۴ ساعت دوباره تکرار شود.

موارد مصرف:

دیمینازن جهت درمان گونه های مختلف بابزیوز مانند B. equi, B. ovis و B. bovis، B. canis، درمان تریپانوز و میازیس ناشی از T. theileri، T. congolense، T. evansi، T. equinum، T. vivax، T. equiperdum، T. equiperdum می شود. این دارو در تمام گونه های حیوانات برای درمان بابزیوز و تریپانوزو میازیس عضلانی و زیر جلدی استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو در اسب فقط به صورت عضلانی توصیه می گردد. دوز درمانی این دارو بسته به نوع انگل و مقاومت آن در گونه های مختلف از ۲/۵ تا ۷ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام زنده به صورت تزریق عضلانی یا زیر جلدی استفاده شود.

زمان پرهیز از مصرف:

تا ۲۱ روز پس از درمان با دیمینازن از مصرف گوشت دام خودداری شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای بین ۳-۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ویال ۵۰ میلی لیتری