

**ترکیب:**

هر لیتر از محلول حاوی ۱۰۰ گرم انرو فلوکساسین است.

**مکانیسم اثر:**

انرو فلوکساسین آنتی بیوتیک وسیع الطیفی از دسته فلوروکینولون ها است که اثر خود را با مهار آنزیم DNA gyrase و در نتیجه از بین بردن باکتری اعمال می کند. سرعت جذب خوراکی این دارو نسبتاً بالاست و به سرعت در بافت های مختلف بدن انتشار می یابد.

**موارد مصرف:**

انرو فلوکساسین برای درمان بیماری های عفونی منفرد و یا مخلوط ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی هوازی و مایکوپلازماها در مرغ و بوقلمون نظیر CRD، کلی سیتی سمی، وبای مرغان، کوربازی عفونی، سالمونلوز و سایر عفونت های ناشی از باکتری های حساس به این دارو استفاده می گردد.

**مقدار و نحوه مصرف:**

به میزان ۰/۵ لیتر به ازاء هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی طیور به مدت ۵ - ۳ روز بنا به توصیه دامپزشک. انروفلوکساسین را می توان مستقیماً به منبع آب سالن اضافه نمود. آب حاوی دارو باید طی ۲۴ ساعت مصرف شود و طی دوره مصرف منبع آب دیگری در اختیار طیور نباشد. در مورد سالمونلوز یا پاستورلوز دوره درمانی ۱۰-۵ روز باید اعمال شود.

**زمان پرهیز از مصرف:**

در مرغ ۹ روز و در بوقلمون ۱۱ روز قبل از کشتار مصرف دارو باید قطع گردد.

**تداخل دارویی:**

مصرف همزمان انرو فلوکساسین با تتراسایکلین ها و ماکرولیدها به علت احتمال بروز اثرات آنتاگونیستی توصیه نمی شود.

**موارد احتیاط:**

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در طیور تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

**شرایط نگهداری:**

در جای خشک، بین ۱۰ تا ۲۵ درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.

**بسته بندی:**

ظروف ۱ و ۲ لیتری