

انروفلوکساسین ۱۰٪ رویان®  
(پمپ)

Enrofloxacin 10%®  
(Pump)  
ROOYAN



ROOYAN  
DAROU

محلول خوراکی  
Oral Solution

آنتی بیوتیک



هر لیتر آب آشامیدنی زیر نظر دامپزشک (در طوطی سانان میزان دارو را می توان تا ۵ میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی با توصیه دامپزشک تجویز نمود)  
**توجه:** هر پاف معادل یک میلی لیتر می باشد.

### زمان پرهیز از مصرف:

در مرغ ۹ روز و در بوقلمون ۱۱ روز قبل از کشتار مصرف دارو باید قطع گردد.

### تداخل دارویی:

مصرف همزمان انرو فلوکساسین با تتراسایکلین ها و ماکرولیدها به علت احتمال بروز اثرات آنتاگونیستی توصیه نمی شود.

### موارد احتیاط:

در طیور تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

### شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود. پس از مصرف، درب محصول را بخوبی ببندید.

### بسته بندی:

ظروف ۱۰۰ میلی لیتری با پمپ

### ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول حاوی ۱۰۰ میلی گرم فلوکساسین است.

### مکانیسم اثر:

انرو فلوکساسین آنتی بیوتیک وسیع الطیفی از دسته فلوروکینولون ها است که اثر خود را با مهار آنزیم DNA gyrase و در نتیجه از بین بردن باکتری اعمال می کند. سرعت جذب خوراکی این دارو نسبتاً بالاست و به سرعت در بافت های مختلف بدن انتشار می یابد.

### موارد مصرف:

انروفلوکساسین برای درمان بیماری های عفونی تک یا مخلوط ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی هوازی و مایکوپلاسماها در ماکیان، پرندگان زینتی و وحشی نظیر کلی سپتی سمی، پاستورلوز، کلأمیدوز، کلستریذوز، سالمونلوز و سایر عفونت های ناشی از باکتری های حساس به این دارو استفاده می گردد.

### مقدار و نحوه مصرف:

۱۰ میلی گرم انروفلوکساسین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن زنده در روز.

**ماکیان و بوقلمون:** ۰/۵ تا یک میلی لیتر از محلول دارو به ازای هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز بنا به توصیه دامپزشک

**پرندگان زینتی:** ۲ میلی لیتر از محلول دارو به ازای