

**ترکیب:**

هر گرم از پودر باستراسین حاوی ۱۰۰ میلی گرم باستراسین متیلن دی سالیسیلات می باشد.

مکانیسم اثر:

باستراسین با بلوکه کردن غیراختصاصی واکنش های فسفوریلاز مانع تولید پپتیدوگلیکالان در باکتری می شود، گاهی این واکنش ها در طی سنتز دیواره سلولی اتفاق می افتند.

موارد مصرف:

این دارو برای درمان بیماری آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس یا سایر میکروب های حساس به باستراسین در طیور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین پودر محلول در آب باستراسین متیلن دی سالیسیلات برای کمک به بهبود بیماری کوکسیدیوز طیور نیز استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

جهت درمان آنتریت نکروتیک ۱۰۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۷-۵ روز
جهت تسریع درمان کوکسیدیوز و رفع استرس ۱۰۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵-۴ روز
جهت درمان آنتریت نکروتیک در بوقلمون ها به میزان ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی

موارد منع مصرف:

در حیواناتی که به باستراسین حساسیت دارند و نیز دارای نارسایی کلیوی می باشند مصرف این دارو مجاز نمی باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در موقع استفاده از دارو دستکش و ماسک را بکار ببرید. بعد از باز شدن ساشه آنرا تا ۴۸ ساعت بعد باید مصرف نمود. قابلیت محافظت از محتویات درون ساشه تا مدت زمان گفته شده امکانپذیر است.

بدون تجویز دامپزشک مصرف نگردهد.

این دارو دارای بسته بندی های متعددی است که امکان مصرف با بسته بندی متناسب را به مصرف کننده می دهد لذا بعد از محاسبه مقدار مورد نیاز، بسته بندی متناسب را تهیه فرمایید.

همراه با این دارو از داروهایی که سبب اسیدی شدن آب می شوند مانند اسیدیفایرها خودداری نمایید.

شرایط نگهداری:

دور از نور مستقیم آفتاب، در جای خشک و دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

بسته بندی:

ساشه های ۶۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی