

فنبندازول ۲/۵٪



ROOYAN
DAROU

سوسپانسیون خوراکی
Oral Suspension

Fenbendazole 2.5%

فند انگل



ترکیب:

هر میلی لیتر از سوسپانسیون حاوی ۲۵ میلی گرم فنبندازول می باشد.

موارد مصرف:

فنبندازول بر مراحل نوزادهای در حال رشد و خفته و بالغ نماتودهای لوله گوارش گوسفند و بز و بالغ کرم های ریوی آنها، سستوهای بالغ لوله گوارش نشخوارکنندگان، نماتودهای بالغ و سستوهای لوله گوارش تک سمی ها و گوشتخواران موثر است. همچنین مانند بنزیمیدازول ها دارای اثرات تخم کشی می باشد و بر روی این کرم ها اثر گذار است:

نشخوارکنندگان: همونکوس، استرناژیا، تریکوسترونزیلوس، نماتودیروس، یونوستوموم، کوپریا، نئوآسکاریس، ازوفاگوستوموم، شابرینا، تریشورپس و سستوهای بالغ تک سمی ها: استرونگل های بزرگ و کوچک، آسکاریس، اکسیپور و استرونژیلیتیدس
سگ و گربه: آسکاریس ها، انکیلوستوما، تریشورپس و سستوها

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو را باید با استفاده از دستگاه خوراندن داروهای مایع (Drenching Gun) به حیوان خوراند. بطری حاوی سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. دز مصرفی این سوسپانسیون در حیوانات مختلف به شرح زیر می باشد:

گوسفند و بز: ۱۰-۵ میلی گرم فنبندازول به ازای یک کیلوگرم وزن زنده دام (۲-۱ میلی لیتر برای ۵ کیلوگرم وزن زنده) و در صورت آلودگی به سستوها مصرف ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده توصیه می شود.

گاو: ۷/۵ میلی گرم فنبندازول به ازای یک کیلوگرم وزن زنده دام (۳ میلی لیتر برای ۱۰ کیلوگرم وزن زنده) توصیه می شود.

در آلودگی های انگلی دستگاه تنفس (دیکتیوکولوس

آرنفیلدی)، مقدار ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام به مدت ۵ روز متوالی قادر است آلودگی را به خوبی مهار و محدود نماید.

تک سمی ها: ۷/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا ۳ میلی لیتر برای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن جهت درمان آلودگی های گوارشی و ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا ۴ میلی لیتر برای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۵ روز متوالی جهت درمان آلودگی های ریوی توصیه می شود.

سگ و گربه: ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا ۲ میلی لیتر برای هر کیلوگرم وزن بدن توصیه می شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۷ روز

شیر: ۳ روز

موارد احتیاط:

از یخ زدگی سوسپانسیون جلوگیری شود.
در صورت ایجاد آلودگی مجدد از محیط آلوده، ضروری است درمان در دام ها تکرار گردد.

برای دام هایی که در مراحل مختلف آبستنی و فقر تغذیه ای قرار دارند به راحتی قابل تجویز می باشد.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه سلسیوس) نگهداری شود.

بسته بندی:

ظروف ۱ لیتری