



فلورفنیکل ۱۰٪

Florfenicol 10%

آنتی بیوتیک



موارد عدم مصرف:

در طیور تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف:

در مرغ های گوشتی باید ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

تداخل دارویی:

از مصرف این دارو به همراه سایر ترکیبات دارویی بخصوص ماکرولیدها، لینکومایسین و کلیندامایسین پرهیز شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای ۲۵ - ۱۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ظروف ۱ و ۲ لیتری

ترکیب:

هر میلی لیتر محلول خوراکی فلوئورفن رویان® حاوی ۱۰۰ میلی گرم فلورفنیکل است.

مکانیسم اثر:

فلوئورفن رویان® یک آنتی بیوتیک سنتتیک وسیع الطیف است که با ایجاد وقفه در عمل آنزیم پپتیدیل ترانسفراز در ریبوزوم ها باعث توقف سنتز پروتئین در باکتری و از بین رفتن آن می شود.

موارد مصرف:

در درمان انواع عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت مانند استرپتوکوک ها، استافیلوکوک ها، کلستریدیوم ها، E. Coli، پاستورلا مولتوسیدا و همچنین سالمونلاتیفی موربوم موثر می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

به میزان ۲۰ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن طیور در هر روز، هر لیتر فلوئورفن رویان® را باید به ۱۰۰۰ لیتر آب اضافه و مصرف نمود. درمان باید به مدت ۳-۵ روز ادامه یابد. آب محتوی دارو باید هر روز به صورت تازه تهیه و در طول همان روز به طور کامل مصرف شود. در طول درمان منبع آب دیگری به غیر از آب حاوی دارو در اختیار طیور نباشد.