

لوامیزول + تریکلاندازول ۸/۷۵٪ رویان®  
Levamisole  
+ Triclabendazole 8.75%®  
ROOYAN



ROOYAN  
DAROU

سوسپانسیون خوراکی  
Oral Suspension

ضد انگل



### ترکیب:

هر میلی لیتر سوسپانسیون حاوی:  
لوامیزول (ملح هیدروکلراید)  
تریکلاندازول  
۳۷/۵ میلی گرم  
۵۰ میلی گرم

### مکانیسم اثر:

این محصول با اثر قوی، ضد کرم های روده ای - معدی و کبدی است و کرم های گرد روده، دستگاه تنفس و خصوصاً سه مرحله چرخه کبدی را از بین می برد.

لوامیزول پس از تجویز خوراکی از روده جذب شده و در سراسر بدن پخش می گردد. نیمه عمر دفع پلاسمایی دارو در گونه های مختلف متفاوت بوده، در گاو ۴-۶ ساعت و سگ ۴-۱/۵ ساعت می باشد. متابولیت ها از طریق ادرار و مدفوع ظرف چند روز دفع می گردند.

تریکلاندازول پس از مصرف خوراکی به سرعت در بدن به متابولیت های سولفو کساید و سولفون تبدیل می شود. حداکثر غلظت پلاسمایی آن طی ۳۶-۱۲ ساعت پدید می آید. حدود ۵۰٪ دارو پس از متابولیزه شدن از طریق صفرا دفع می گردد. لوامیزول با تاثیر بر روی سیستم عصبی کرم سریعاً باعث فلج شدن انگل ها و در نتیجه تسهیل در جدا شدن آنها از مخاط دستگاه تنفس و گوارش و خروج سریع انگل ها از بدن می شود. تریکلاندازول از طریق مهار آنزیم فومارات ردوکتاز، اعمال مکانیکی و تولید انرژی را در بدن انگل مختل نموده و باعث نابودی آن می شود. تریکلاندازول بر چرخه زندگی انگل از مرحله نابالغ تا بلوغ به طور کامل اثر دارد.

### موارد مصرف:

**کرم های ریوی:** دیکتیوکولوس فیلاریا و پروتوسترونزیلوس  
**کرم های معدی - روده ای:** همونکوس کونتورتوس، انواع گونه های تریکوسترونزیلوس، استرناژیا، کوپریا، نمانتودیروس، بونوستوموم، ازوفا گوستوموم، شاپرتیا، استرونزیلوس پایلووزوس و تریشوریس اوویس.  
**کرم های کبدی:** فاسیولا هیاتیکا، فاسیولا ژیکانتیکا و فاسیولویدیس مگنا.

جهت اجرای برنامه کنترل و مبارزه با بیماری های انگلی و حصول نتیجه مطلوب طبق توصیه دکتر دامپزشک عمل نمایید.

### مقدار و نحوه مصرف:

محصول به صورت خوراکی و پس از تکان دادن شدید بطری تا رسیدن به مخلوط یکنواخت توسط دارو خوران تجویز

می شود. سوسپانسیون برای استفاده با تمام انواع دارو خوران های اتوماتیک مناسب است.

۱ میلی لیتر سوسپانسیون برای ۵ کیلوگرم وزن بدن در گوسفند و بز توصیه می شود.

### زمان پرهیز از مصرف:

**شیر:** ۷ روز

**گوشت:** ۲۸ روز

### موارد احتیاط:

این محصول را می توان با اطمینان به دام های جوان و آبستن خورانی و لی در آبستنی های سنگین و حیوانات تحت استرس و یا بسیار ضعیف دارو با احتیاط مصرف شود. بعد از کار با دارو دست ها را خوب بشویید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

این دارو برای ماهیان سمی است لذا از ورود آن به آب های جاری جلوگیری شود.

در اثر خوردن دارو در مقادیری بیش از مقادیر درمانی ممکن است ۶۰-۱۵ دقیقه پس از مصرف علائمی از قبیل افزایش ترشح بزاق تحریک پذیری اعصاب، تکرر ادرار و مدفوع، مشکل تنفسی، لرزش و ناهماهنگی عضلات در گوسفند و بز مشاهده گردد که موقتی بوده و ظرف حدود ۱ ساعت برطرف می شود.

سوسپانسیون می بایست حتماً برحسب وزن صحیح دام و مقدار دقیق توصیه شده برای آن مصرف گردد.

به علت امکان بروز پنومونی استنشاقی، دارو را به زور به دام نخورانید.

### شرایط نگهداری:

به صورت ایستاده زیر ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود، از مجاورت با حرارت، یخ زدگی و نور مستقیم آفتاب محافظت گردد.

### بسته بندی:

ظرف ۱ لیتری