

**موارد احتیاط:**

در هنگام حمل و نقل و کاربرد دارو از ماسک، لباس محافظ و دستکش استفاده نمائید. پس از حمل و نقل و کاربرد پرمیکس لینکومایسین، دست ها و صورت را با آب فراوان بشویید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید. مصرف لینکومایسین در اسب، نشخوارکنندگان، خرگوش و خوکچه هندی باعث ایجاد ناراحتی های شدید گوارشی می گردد.

لینکومایسین بر روی فلور روده ای تاثیر منفی ندارد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، دور از نور مستقیم و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت ۵ کیلوگرمی

ترکیب:

هر کیلوگرم پرمیکس لینکومایسین محتوی ۸/۸ گرم لینکومایسین (ملح هیدروکلراید) می باشد.

موارد مصرف:

جهت کنترل ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینتس، کمک به رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی در نیمچه های گوشتی و کنترل CRD

مقدار و نحوه مصرف:

جهت ورم روده نکروتیک، کنترل CRD و بهبود میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی با دوز ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک از هفته اول پرورش جوجه های گوشتی تا انتهای دوره

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

تداخل دارویی:

مصرف هم زمان با اریتروماسین، تایلوزین و نوویوسین توصیه نمی شود.

این محصول با کلیه کوکسیدیاواستات ها و محرک های رشد سازگار می باشد.