

# مامی فورت سیکادو

سوسپانسیون داخل پستانی

# Mamifort Secado

Intramammary suspension



## اثرات جانبی:

مورد خاصی گزارش نشده است.

## درمان در دوره شیرواری و آبستنی:

در گاوهای شیروار مصرف نشود.

## تداخل دارویی:

همراه با آنتی بیوتیک های باکتریوستات تجویز نشود.

## مصرف بیش از اندازه:

بسیار بعید است که مصرف بیش از اندازه باعث مسمومیت گردد. نهایت دوز قابل تحمل ۵ برابر دوز توصیه شده می باشد.

## دوره منع مصرف:

گوشت: ۲۸ روز

شیر: ۹۶ ساعت پس از زایمان

## شرایط نگهداری:

در جای خنک (کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس) و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

## بسته بندی:

جعبه های ۴ سرنگی و سطل های ۴۸ سرنگی

## تولیدکننده:

شرکت سیوا - اسپانیا

## ترکیبات:

کلوکساسیلین ۵۰۰ میلی گرم

(به صورت بنزاتین)

آمپی سیلین ۲۵۰ میلی گرم

(به صورت تری هیدرات)

## حیوان هدف:

گاو، گوسفند و بز

## مقدار مصرف:

گاو: یک سرنگ مامی فورت سیکادو در هر کارتیه فقط یک بار.

## موارد مصرف:

پیشگیری و درمان ورم پستان های ایجاد شده بوسیله میکروارگانیزم های حساس به ترکیب کلوکساسیلین / آمپی سیلین در گاوهای خشک.

## موارد منع مصرف:

در دام های دارای سابقه حساسیت به پنی-سیلین ها مصرف نشود.

در دام های دارای سابقه حساسیت به سفالوسپورین ها با احتیاط مصرف شود.

## موارد احتیاط:

درمان باید در ابتدای دوره خشکی انجام شود. بعد از آخرین شیردوشی و قبل از تجویز این محصول، کارتیه باید کاملاً تخلیه شده و با محلول ضد عفونی تمیز گردد. بعد از تجویز سرنگ پستان را بخوبی ماساژ دهید تا پخش سوسپانسیون در کارتیه تسهیل گردد.