

نئومایسین ۲۰٪ رویان®

Neomycin 20%®
RCOYAN



RCOYAN
DAROU

پودر قابل حل در آب

Water Soluble Powder

آنتی بیوتیک



مصرف شیر دو روز پس از درمان و تخم مرغ ۱۴ روز پس از درمان گله مجاز است.

تداخل دارویی:

تجویز توأم با آمینوگلیکوزیدها و داروهای مدر نظیر فوروزماید توصیه نمی شود.

موارد احتیاط:

نئومایسین سولفات را بیش از ۵ روز متوالی نباید مصرف نمود. این دارو در نارسایی های کلیوی، انسداد روده ها و بروز حساسیت به دارو نباید مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر دمای ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ساشه ۵۰۰ گرمی

ترکیب:

هر گرم پودر حاوی ۲۰۰ میلی گرم نئومایسین (سولفات) می باشد.

موارد مصرف:

نئومایسین سولفات به طور عمده بر روی باکتری های هوازی گرم منفی نظیر اشریشیا کلی، کلبسیلا، پروتئوس، سالمونلا و برخی از باکتری های گرم مثبت اثر دارد، ولی بر روی باکتری های بی هوازی تأثیر مطلوبی ندارد. این دارو در درمان عفونت های باکتریایی گوارشی نظیر انواع آنتریت و اسهال در دام و طیور تجویز می گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور:

آب آشامیدنی: یک بسته ۵۰۰ گرمی در ۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ - ۵ روز متوالی مخلوط با دان: دو بسته و نیم (۱۲۵۰ گرم) از پودر در یک تن دان به مدت ۳ - ۵ روز متوالی

گوساله، بره و بزغاله:

۱۲ - ۱۴ میلی گرم نئومایسین (سولفات) به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام به مدت ۳ - ۵ روز متوالی.

زمان پرهیز از مصرف:

طیور گوشتی: ۵ روز

گوساله: ۳۰ روز

بره و بزغاله: ۲۰ روز