

# Norodine 24

## Solution for Injection

# نورودین ۲۴

## محلول برای تزریق

توسط روش های دیگر خودداری شود. تزریق داخل شکمی ممنوع است.

### منع مصرف

در طول درمان شیر و گوشت حیوان تحت درمان مصرف نشود. اسب های تحت درمان نباید هیچ وقت به مصرف انسان برسند.

**گاو:** گوشت ۱۲ روز - شیر ۲ روز پس از آخرین تزریق **هشدارها**

در حیواناتی که حساسیت به سولفونامیدها دارند، یا مشکل کبدی حاد و یا مشکلات خونی دارند مصرف نشود. در صورت مشاهده عوارض جدی با دامپزشک مشورت کنید.

### احتیاط دارویی

پس از اولین مصرف بقیه دارو را در عرض ۲۸ روز مصرف کنید و باقی مانده را پس از این مدت دور بریزید. آب آشامیدنی کافی در طول درمان باید در اختیار حیوان قرار گیرد. در اسب هایی که دارای آریتمی قلبی در اثر مصرف داروهایی نظیر بعضی بیهوش کننده ها و آرام بخش ها می باشند مصرف نشود. گاهی شوک های آنافیلاکتیک که می تواند باعث مرگ شود در اثر مصرف سولفونامیدهای تقویت شده به خصوص به صورت داخل وریدی مشاهده شده است و دامپزشک باید هنگام تزریق به این نکته توجه داشته باشد. جهت تزریق وریدی، محصول باید تا دمای بدن گرم شده و به صورت آهسته تزریق شود. به محض وقوع اولین علائم عدم تحمل، تزریق باید متوقف شده و درمان شوک شروع شود.

### احتیاطات کاربر

از تماس با پوست و تزریق اتفاقی به خود، خودداری شود. سولفونامیدها متعاقب مصرف می توانند باعث بروز حساسیت بیش از حد شوند. حساسیت به این دارو می تواند باعث حساسیت متقاطع با سایر آنتی بیوتیک ها شود. حساسیت به این دارو گاهی می تواند بسیار شدید باشد.

۱ - اگر به سولفونامیدها حساس می باشید از دست زدن به این دارو پرهیز کنید.

۲ - اگر پس از در معرض دارو قرار گرفتن علائمی مانند جوش های پوستی دارید با پزشک مشورت کنید. دوز از دسترس کودکان نگهداری شود.

### شرایط نگهداری

زیر ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود. از انجماد خودداری شود. کریستاله شدن دارو در دمای پایین با گرم کردن برگشت پذیر است. دوز از نور نگهداری شود.

### بسته بندی

ویال ۱۰۰ میلی لیتری

**تولیدکننده:** شرکت نوربروک - ایرلند



### ترکیب

هر میلی لیتر حاوی:

سولفادیازین ۲۰۰ میلی گرم

تری متوپریم ۴۰ میلی گرم

### موارد مصرف

نورودین ۲۴ در درمان بیماری های باکتریایی حاد، تحت حاد و مزمن در اسب، گاو، سگ و گربه کاربرد دارد.

طیف درمانی آن شامل باکتری های گرم مثبت و باکتری های گرم منفی شامل استرپتوکوک ها، استافیلوکوک ها، اکتینوباسیل ها، اکتینومایسس ها، سالمونلا، پاستورلا، پنوموکوک ها، پروتوس، ای کولای، کورینه باکتریوم، ویبریو، بوردتلا، بروسلا، کلبسیلا و هموفیلوس ها می باشد. نورودین ۲۴ می تواند در عفونت های تنفسی با منشأ باکتریایی شامل ریپتیت، پنومونی، برونشیت و در عفونت های باکتریایی ثانویه بعد از بیماری های ویروسی مانند پنومونی ویروسی یا عفونت های مایکوپلاسما می به کار رود. همچنین در عفونت های دستگاه ادراری - تناسلی (التهاب مثانه، التهاب واژن، التهاب پیشابراه، التهاب کلیه و التهاب رحم)، عفونت های دستگاه گوارش (شامل اسهال نوزادان و سالمونلوز) و سایر عفونت ها شامل گندیدگی سم، التهاب پستان حاد و عفونت های گوش، حلق و چشم مصرف می شود.

### دوز و روش مصرف

جهت گاو یک میلی لیتر برای ۱۶ کیلوگرم وزن بدن روزانه داخل عضلانی یا تزریق آهسته داخل وریدی. نورودین ۲۴ می تواند به صورت تزریق آهسته داخل وریدی نیز زمانی که مقادیر بالا و سریع سولفادیازین و تری متوپریم داخل خون نیاز می باشد مصرف شود. دوز در اسب یک میلی لیتر برای ۱۶ کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق داخل وریدی آهسته می باشد. دوز در سگ و گربه یک میلی لیتر برای هر ۸ کیلوگرم وزن بدن فقط به صورت زیر جلدی می باشد. محل قابل توصیه تزریق در سگ پوست شل بالای گردن می باشد. یکبار تزریق برای موارد غیر کمپلکس شده کافی می باشد، اما در عفونت های شدید می توان تزریق را حداکثر تا ۵ روز، به صورت روزانه تا محو شدن علائم ادامه داد. جهت دقت در حجم تزریق به خصوص در حجم های کم از سرنگ دقیق و مناسب استفاده شود. غیر از راه های توصیه شده جهت تزریق از تزریق