



دوره مصرف اکسی تتراسایکلین از کاربرد ترکیباتی که حاوی کاتیون های فلزی مانند آهن، کلسیم و منیزیم باشد به علت ایجاد کمپلکس خودداری شود. در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر دمای ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت های ۱ و ۵ کیلوگرمی

ترکیب:

هر کیلوگرم حاوی ۵۰۰ گرم اکسی تتراسایکلین خالص

موارد مصرف:

پرمیکس اکسی تتراسایکلین ۵۰٪ برای درمان بیماری های زیر به کار می رود:

- CRD و CRD COMPLEX

- سینوزیت و عفونت های فوقانی دستگاه تنفس

- عفونت های دستگاه گوارش و اسهال های با منشأ نامشخص

- وبای مرغان، بیماری تاج آبی و هگزامیتیاژیس

مقدار و نحوه مصرف:

۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم در یک تن خوراک یا طبق تجویز دکتر دامپزشک

زمان پرهیز از مصرف:

بین آخرین درمان با اکسی تتراسایکلین و کشتار طیور ۷ روز فاصله باشد. تخم مرغ طیور تحت درمان حداقل تا ۷ روز پس از آخرین درمان استفاده نشود.

موارد احتیاط:

مصرف هم زمان اکسی تتراسایکلین ها با کینولون ها، پلی میکسین B، پنی سیلین، استرپتومایسین، باسیتراسین، نوامایسین و بی کربنات سدیم به علت ایجاد اثرات آنتاگونیستی توصیه نمی شود. هم چنین در طول