

PROYPACT® 50

پودر پروپی پکت® ۵۰



حاوی ۵۵٪ پیش ساز گلوکز شامل ۴۵٪ پروپیلن گلیکول و ۱۰٪ مالت

برنامه استفاده در گاوهای شیری

PROYPACT® 50

پودر پروپی پکت ۵۰

تلقیح و بارورسازی دام	آماده سازی برای تلقیح	اوج تولید شیر	آغاز شیرواری	زایشان	آماده سازی دام برای زایش	آغاز دوره خشکی
<ul style="list-style-type: none"> کاهش شدید قند خون تولید ناکافی پروژسترون رنگ کزینی نامناسب رویان 	<ul style="list-style-type: none"> ضعف عمومی ضعف شدید در بازگشت فعالیت تمدداتی (ادامه) وضعیت استراحت در تمددان ها 	<ul style="list-style-type: none"> بالانس شدیداً منفی انرژی ادامه پیدا کردن دریافت انرژی ناکافی افزایش چربی شیر کاهش پروتئین شیر استونمی بالینی و یا تحت بالینی 	<ul style="list-style-type: none"> نیاز شدید به انرژی محدود شدن مصرف جیره دریافت انرژی ناکافی استرس ناشی از زایشان کمبود اشتها استونمی بالینی 	<ul style="list-style-type: none"> شیرواری و آبدنه تولیدمثلی دام به میزان زیاد به نحوه خشک کردن و کیفیت دوره خشکی دام بستگی دارد پروپی پکت® ۵۰ را برای آماده سازی قبل از زایش و مراحل فیزیولوژیکی مختلف استفاده نمایندید 	مشاهدات با بالیم	
<ul style="list-style-type: none"> مرگ رویان واکنی (Repeat breeding) 	<ul style="list-style-type: none"> کاهش فعلی و یا تاخیر در بروز فعلی 	<ul style="list-style-type: none"> ادامه پیدا کردن کاهش وزن اختلالات کبدی کاهش تولید شیر 	<ul style="list-style-type: none"> کاهش وزن کدام مراحل فیزیولوژیکی متفاوت زایش دچار اختلال خواهد شد 	<ul style="list-style-type: none"> کاهش وزن کدام مراحل فیزیولوژیکی متفاوت زایش دچار اختلال خواهد شد 	نتایج	

PROYPACT® 50

پودر پروپی پکت ۵۰

راه حل: پروپی پکت ۵۰ به کاهش بالانس منفی انرژی کمک می کند.

زمان تلقیح	آماده سازی برای تلقیح	تولید شیر	شیرواری	آماده سازی دام برای زایش
مقدار استفاده ۱۵۰ - ۲۲۵ گرم روزانه	مقدار استفاده ۱۵۰ - ۲۲۵ گرم روزانه	مقدار استفاده ۱۵۰ - ۲۲۵ گرم روزانه	مقدار استفاده ۱۵۰ - ۲۲۵ گرم روزانه	مقدار استفاده ۱۰۰ گرم روزانه

پودر پروپی پکت ۵۰

حاوی ۵۵٪ پیش ساز گلوکز (۴۵٪ پروپیلن گلیکول و ۱۰٪ مالت)

قابل استفاده مستقیم در جیره مخلوط و آماده شده و یا اضافه شدن به اقلام جیره

بسته بندی: کیسه های ۲۰ کیلو گرمی

تولیدکننده: شرکت دیفاگری - فرانسه