



### تداخل دارویی:

در صورت استفاده دراز مدت ممکن است باعث ایجاد اختلالات گوارشی از جمله اختلال در جذب مواد مغذی شود.

### موارد احتیاط:

مقادیر درمانی توصیه شده بهتر است توسط لوله معدی خورنده شود تا از بروز احتمالی پنومونی استنشاقی جلوگیری بعمل آید. در مقادیر درمانی توصیه شده هیچگونه عوارض و اثرات جانبی گزارش نشده است. این دارو بی رنگ بوده و در صورت مشاهده تغییر رنگ از مصرف آن خودداری شود. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری شود.

### شرایط نگهداری:

در ظروف در بسته و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

### بسته بندی:

ظروف ۲۵۰ میلی لیتری، ۱ و ۴ لیتری

### ترکیب:

هر بطری حاوی پارافین خوراکی دارویی می باشد.

### موارد مصرف:

این دارو به عنوان ملین و نرم کننده مدفوع در انواع اختلالات دستگاه گوارش از جمله انباشتگی ها، سوء هاضمه، یبوست، نفخ و همچنین کولیک شنی اسب بکار می رود. پارافین موجب کاهش کشش سطحی محتویات شکمبه شده و بعنوان ضد نفخ، در درمان نفخ نشخوار کنندگان بکار میرود. این دارو در موارد انباشتگی مدفوع در انتهای روده بزرگ و اختلال در دفع مکنونیوم نوزادان از طریق رکتال تجویز می گردد.

### مقدار و نحوه مصرف:

**اسب و گاو:** ۱ تا ۴ لیتر خوراکی  
**گوساله و کره اسب:** ۶۰ تا ۱۲۰ میلی لیتر خوراکی یا ۵۰ تا ۶۰ میلی لیتر رکتال جهت دفع مکنونیوم  
**گوسفند و بز:** ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر خوراکی یا ۵ تا ۱۰ میلی لیتر رکتال جهت دفع مکنونیوم بره ها  
**سگ:** ۲ تا ۶۰ میلی لیتر خوراکی  
**گربه:** ۲ تا ۲۰ میلی لیتر خوراکی  
در صورت لزوم تکرار درمان، بهتر است مقادیر فوق تقسیم شده، روزانه در ۲ الی ۳ نوبت تجویز گردد.

### زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.