

پن استرپ

سوسپانسیون برای تزریق

Pen & Strep

Suspension For Injection



سوسپانسیون مایع تزریقی سفید تا کرم رنگ هر میلی لیتر این محصول حاوی مواد زیر می باشد:
پروکائین پنی سیلین ۲۰۰ میلی گرم
دی هیدرو استرپتومایسین سولفات ۲۵۰ میلی گرم

موارد کاربرد

پن استرپ در گاو، اسب و گوسفند برای درمان عفونت های که عوامل آنها حساس به پنی سیلین و یا استرپتومایسین هستند مانند:

آرکناوباکتریوم پایورنژ، اریزیلوتریکس روزیوپاتیه، کلبسیلا پنومونیا، گونه های لیستریا، مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا، گونه های استافیلوکوکوس، گونه های استرپتوکوکوس و گونه های سالمونلا به کار می رود.

پن استرپ در درمان عفونت هایی شبیه موارد ذیل که عوامل میکروبی آنها حساس به این آنتی بیوتیک هستند، موثر می باشد:

اریزیلیاس، عفونت ناف یا مفصل، عفونت های دستگاه تنفس شامل پنومونی و ریپیت آتروفیک، لیستریوز، مننژیت، سپتی سمی، توکسمی همراه با ورم پستان، عفونت های دستگاه تناسلی، آنتریت ناشی از گونه های سالمونلا، سالمولوز و کنترل عفونت های ثانویه باکتریایی متعاقب بیماری های ویروسی. ترکیب پنی سیلین و دی هیدرو استرپتومایسین خصوصاً جهت درمان عفونت های ترکیبی ناشی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بسیار مفید واقع می گردد.
پن استرپ را می توان در حیوانات آبستن و در حین شیرواری بدون بروز مشکل مصرف کرد.

مقدار و نحوه مصرف

دوز روزانه توصیه شده برای گاو، اسب و گوسفند ۸ میلی گرم پروکائین پنی سیلین و ۱۰ میلی گرم دی هیدرو استرپتومایسین سولفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل یک میلی لیتر پن استرپ برای هر ۲۵ کیلوگرم وزن بدن می باشد. دوز محاسبه شده باید به شکل تزریق عمیق عضلانی یک بار در روز و به مدت ۳ روز پیاپی تجویز گردد. میزان دوز تزریق شده در هر نقطه نبایدستی از مقادیر ذیل تجاوز کند:

اسب ۱۵ میلی لیتر، گاو ۶ میلی لیتر و گوسفند ۳ میلی لیتر

زمان پرهیز از مصرف

حیواناتی که تحت درمان قرار دارند نباید به کشتارگاه فرستاده شوند.

شیر گوسفند: در گوسفندانی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد نباید مصرف شود.

گوشت گوسفند: ۳۱ روز

شیر گاو: ۶۰ ساعت

گوشت گاو: ۲۳ روز

موارد منع مصرف و احتیاط

در موارد حساسیت به پنی سیلین ها نبایدستی

مصرف گردد. مقادیر تجویز نباید از دوز توصیه شده تجاوز نماید. ممکن است یک واکنش موضعی و محسوس در محل تزریق عضلانی در اسب دیده شود.

مراقب تزریق تصادفی به خود حین تزریق دارو باشید. در صورت وقوع چنین مشکلی، بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید. ممکن است تزریق، تنفس، خوردن یا تماس با پوست پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها حساسیت ایجاد نماید. حساسیت نسبت به پنی سیلین ها می تواند منجر به حساسیت متقاطع به سفالوسپورین ها شود و برعکس بعضاً واکنش نسبت به این مواد ممکن است خطرات جدی در بر داشته باشد. از تجویز همزمان این دارو با تتراسایکلین ها یا سایر آمینوگلیکوزیدها خودداری شود.

تجویز پیش از حد نیاز به درمان ندارد.

۱ - چنانچه نسبت به این دارو حساسیت وجود دارد، از دست زدن و کار با این محصول اجتناب شود.

۲ - جهت جلوگیری از تماس با محصول با احتیاط حمل شود.

۳ - چنانچه متعاقب تماس با این دارو علائم حساسیت مانند جوش پوستی بروز نماید، باید هر چه سریعتر بدنال اقدامات پزشکی بوده و پزشک را در جریان کلیه موارد مربوطه قرار دهید. تورم صورت، لب ها، چشم ها یا هر گونه مشکلی در سیستم تنفسی به عنوان علائم جدی تر محسوب شده و باید هر چه سریعتر به پزشک مراجعه نمود.

۴ - دست ها را بعد از استفاده و کار با این محصول بشویید.

قبل از استفاده، بطری حاوی محصول را تکان دهید. متعاقب اولین دوز استفاده شده از محصول، کل محتویات بطری باید طی ۲۸ روز مصرف گردد و باقی مانده پس از این مدت دور ریخته شود. دور ریختن موادی که مصرف نشده اند باید بر طبق ضوابط زیست محیطی کشور مربوطه صورت گیرد.

همیشه محصول را داخل کارتن خود نگهداری کنید. دوز از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی

ویال ۱۰۰ میلی لیتری

تولیدکننده: شرکت نوربروک - ایرلند



Norbrook
Pharmaceuticals Worldwide



ROOYAN
DAROU
PHARMACEUTICAL COMPANY