

روبیکوکس®

Robicox®



ROOYAN
DAROU

پیش مخلوط
Premix

روبینیدین هیدروکلراید ۶/۶
Robenidine 6.6%

روبیکوکس®



مقدار و نحوه مصرف:

۵۰۰ گرم در هر تن خوراک ابتدا جهت به دست اوردن مخلوط یکنواخت با خوراک ابتدا میزان مورد نیاز در ۱۰ کیلوگرم خوراک و سپس به ترتیب در ۱۰۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک مخلوط نمایید.

زمان پرهیز از مصرف:

۵ روز قبل از کشتار مصرف آن قطع گردد. از مصرف دارو در طیور تخم‌گذاری که تولید آنها مصرف انسانی دارد، خودداری گردد.

تداخل دارویی:

با انواع ترکیبات جیره و کلیه آنتی بیوتیک ها از جمله تیامولین سازگار است. این دارو نباید هم زمان با سایر ضدکوکسیدیوزها مصرف شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، دور از تابش نور مستقیم و در کیسه های درسته نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت های ۱ و ۵ کیلوگرمی

ترکیب:

هر کیلوگرم روبیکوکس® حاوی ۶۶ گرم روبینیدین هیدروکلراید می باشد.

مکانیسم اثر:

روبیکوکس® یک کوکسیدیوستات شیمیایی می باشد که برخلاف یونوفوره ها در دو مرحله از جرخه زندگی و یا مهار تقسیم هسته انکل ایمربا تاثیر خود را می گذارد و بر علیه گونه های مختلف ایمربای بیماریزا در طیور گوشتشی شامل ایمربا تلا ایمربا نکاتریکس، ایمربا برونی، ایمربا آسروبلیانا، ایمربا ماکزیما و ایمرباهای پانوژن بوقامون و خرگوش بسیار موثر است. روبیکوکس® یک ضد کوکسیدیوز ایده آل در برنامه clean up و به منظور پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز به خصوص در زمان آلوگی شدید می باشد.

روبیکوکس® در مقایسه با یونوفوره ها کاهش شدید دفع اووسیت را در مدفع سبب می شود و با سایر ضد کوکسیدیوزها مقاومت مقاطعه ندارد. با مانع از ایجاد ضایعه در دیواره اپیتیلیوم روده علاوه بر افزایش وزن و کاهش ضربیت تبدیل غذایی مانع عفونت ثانویه توسعه کالستریدیوم پرفرترن (عامل اصلی آنتربیت نکروتیک) می شود. همچنین بافت اپیتیلیال سالم روده ای شرایط دریافت بالاترین میزان بازدهی غذایی را فراهم می آورد که منجر به رشد سریعتر و کاهش ضربیت تبدیل غذایی می شود.

موارد مصرف:

در طیور گوشتشی، بوقامون و خرگوش مورد استفاده قرار می گیرد.