

سوئیداکس®
داکسی سایکلین (هایکلیت)
محلول خوراکی

SUIDOX®
Doxycycline
Oral Solution



دارند نباید تجویز شود. در حیواناتی که دچار مشکلات کبدی هستند قابلیت تجویز وجود ندارد.

موارد احتیاط:

مانند کلیه تتراسایکلین ها واکنش های آلرژیک و حساسیت به نور ممکن است، دیده شود. چنانچه درمان پرندگان با دوزهای بالاتر از مقادیر پیشنهادی صورت گرفته باشد، درمان باید بلافاصله قطع شده و درمان های علامتی متعاقب آن انجام پذیرد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

دوره پرهیز از مصرف:

گوشه: ۷ روز

تخم مرغ: در مرغ های تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

در حرارت زیر ۳۰ درجه سلسیوس و به دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

بطری یک لیتری

تولیدکننده:

شرکت داروسازی سوپرز دایانا - اسپانیا

ترکیبات:

هر میلی لیتر از محلول خوراکی سوئیداکس حاوی:
داکسی سایکلین (هایکلیت) ۱۰۰ میلی گرم
اکسیپان ۲۰ میلی لیتر

موارد کاربرد:

این محصول جهت درمان کلی باسیلوز، بیماری مزمن تنفسی (CRD) و مایکوپلاسماز و میکروارگانیزم های حساس به داکسی سایکلین توصیه می شود.

گونه های هدف:

طیور

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو باید به صورت خوراکی در آب آشامیدنی پرندگان مخلوط شود. ۵/۰ تا یک میلی لیتر محلول خوراکی سوئیداکس در هر لیتر آب آشامیدنی (معادل ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم داکسی سایکلین) در هر لیتر آب آشامیدنی به شکل روزانه باید در آب مخلوط شود. طول دوره درمان ۳ تا ۵ روز می باشد. توصیه می شود تا هر ۱۲ ساعت آب حاوی دارو به شکل تازه تهیه و در دسترس پرندگان قرار گیرد.

تداخل دارویی:

در حیواناتی که به تتراسایکلین ها حساسیت



SUPER'S DIANA, S.L.



ROOYAN
DAROL
PHARMACEUTICAL COMPANY