

**ترکیب:**

هر کیلوگرم پودر تیامولین ۴۵٪ حاوی ۴۵۰ گرم تیامولین خالص می باشد.

مکانیسم اثر:

آنتی بیوتیکی نیمه صنعتی و باکتریو استاتیک می باشد، که برای درمان سریع عفونت های مایکوپلاسمایی و عفونت های باکتریایی در نیمچه های گوشتی و تخم گذار، مرغ های مادر و تخم گذار و همچنین نیمچه ها و مادرهای بوقلمون استفاده می شود. علاوه بر این تیامولین بر روی بسیاری از باکتری های گرم مثبت و منفی دارای اثر قوی می باشد. این آنتی بیوتیک با جلوگیری کردن از سنتز پروتئین در پیکره میکروب از رشد و تکثیر آن جلوگیری کرده و نهایتاً منجر به از بین رفتن عوامل بیماری زا می شود.

موارد مصرف:

تیامولین برای درمان عفونت های ناشی از مایکوپلاسماء، باکتری های دستگاه تنفسی، مفاصل و روده به کار می رود و با اثری قوی بر میکروارگانیزم های زیر موثر است: انواع مایکوپلاسماء، باکتری های گرم مثبت مانند استرپتوکوک، استافیلوکوک، کلستریدیوم، باکتری های گرم منفی مانند هموفیلوس، اکتینوباسیلوس، پاستورلا، فوزوباکتریوم، باکتریوئیدس، کامپیلوباکتر و غیره. مصرف تیامولین در مرغ های مادر نیز هیچگونه کاهشی در میزان تخمگذاری یا میزان تولید جوجه ایجاد نمی کند.

مقدار و نحوه مصرف:

۱۰۰ گرم تیامولین ۴۵٪ در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۴ روز پس از بروز علائم بیماری. بهترین راه مصرف حل کردن تیامولین در چند لیتر آب ولرم و سپس اضافه کردن به منبع اصلی می باشد. دارو هر روز به صورت تازه تهیه شود.

زمان پرهیز از مصرف:

نیمچه گوشتی ۴۸ ساعت. بوقلمون ۵ روز قبل از کشتار مصرف نشود و در تخم مرغ نیازی به پرهیز از مصرف نمی باشد.

تداخل دارویی:

از مصرف توأم با مونسین، سالینومایسین، ناراسین جداً خودداری شود و بین مصرف این داروها و تیامولین حداقل ۷ روز فاصله باشد.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از تابش نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی:

ساشه ۱۰۰ گرمی