

واکسن زنده لیوفیلیزه علیه آبله طیور

VAIOL-VAC



واکسینه کردن پرندگان با سن کمتر از ۵ یا ۶ هفته ایجاد ایمنی کوتاه مدت می‌نماید. در این موارد توصیه می‌شود تا این پرندگان (که در آینده مرغ مادر یا مرغ تخمگذار خواهند شد) قبل از شروع تخمگذاری مجدداً واکسینه شوند.

در موارد واکسیناسیون‌های اضطراری، با توجه به سرعت پایین پخش عفونت آبله طیور در سطح گله، باید پرندگان درگیر یا مشکوک به بیماری را جدا کرده و فقط پرندگان سالم را واکسینه نمود. چنانچه این واکسیناسیون در شروع درگیری صورت پذیرد معمولاً با موفقیت همراه خواهد بود.

توجه: پس از استفاده از واکسن، ویال‌های واکسن باید ضدعفونی شده یا سوزانده شوند.

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت ۲ تا ۸ درجه سلسیوس نگهداری شود.

عمر قفسه‌ای:

۱۸ ماه

بسته‌بندی:

ویال‌های ۱۰۰۰ دوزی به همراه حلال

تولیدکننده:

شرکت فاترو - ایتالیا

خصوصیات واکسن:

وایول وک با استفاده از یک سویه تخفیف حدت یافته ویروس آبله طیور که بر روی تخم مرغ‌های SPF کشت داده شده و سپس لیوفیلیزه می‌شوند تهیه گردیده است.

۱۰ روز پس از انجام واکسیناسیون ایمنی ایجاد می‌شود؛ بدیهی است که ایمنی نسبی چند روز متعاقب واکسیناسیون وجود خواهد داشت.

ترکیب واکسن:

یک دوز واکسن حاوی: حداقل $10^{4.5}$ EID₅₀

موارد مصرف:

پیشگیری از آبله طیور

میزان و نحوه مصرف:

محتویات ویال واکسن را در حلال حل نموده و سپس آن را کاملاً تکان داده تا فرآیند حل شدن به صورت کامل اتفاق بیفتد؛ مقادیر کمی از واکسن آماده مصرف را در یک ظرف پلاستیکی ریخته و سوزن مخصوص تلقیح واکسن را در محلول مربوطه فرو کرده و سپس در محل چین پوستی بال تلقیح کنید. (در جوجه‌هایی با سن کمتر از ۶ هفته از سوزن تک سر استفاده شود). ظهور تورم به شکل ندول در محل تلقیح (۶ روز پس از تزریق) نشانه موفقیت واکسیناسیون می‌باشد. واکسیناسیون می‌تواند در پرندگان سالم در هر سنی و در هر فصلی از سال انجام پذیرد.