



موارد هشدار:

برای ضدعفونی کردن سرنگ و سوزن جهت تزریق از مواد شیمیایی استفاده نشود زیرا ممکن است باعث غیرفعال شدن اثر واکسن گردد.

در صورتی که در سگ‌های واکسینه شوک آنافیلاکسی مشاهده شد، تجویز اپی نفرین توصیه می‌شود.

از واکسیناسیون در سگ‌های آبستن خودداری گردد.

شرایط نگهداری:

بین ۲ تا ۷ درجه سلسیوس و دور از نور خورشید نگهداری شود.
از سوزن و سرنگ استریل برای تزریق استفاده شود.
از فریز کردن خودداری گردد.

بسته بندی:

ویال های شیشه ای تک دوزی

عمر قفسه ای:

۱۸ ماه

تولیدکننده:

شرکت زونتیس - آمریکا

ترکیبات:

Canine Distemper Virus N-CDV
Canine Adenovirus Virus type 2 Strain Manhattan
Canine Parainfluenza Virus Strain NL-CPI-5
Parvovirus Strain NL-35-D
Leptospira canicola Strain C-51
Leptospira grippityphosa Strain MAL 1540
Leptospira icterohaemorrhagiae Strain NADL (11403)
Leptospira pomona Strain T262

شرح:

واکسن زنده لیوفیلیزه که در سن ۶ هفتگی و بالاتر در سگ‌ها علیه بیماری‌های ایجاد شده توسط ویروس‌های دیستمپر، آدنوویروس، پارآنفلوانزا، پاروو ویروس و لپتوسپیرا به کار می‌رود.

میزان و روش مصرف:

پس از حل کردن کامل واکسن با حلال، ۱ میلی لیتر از محلول واکسن را به صورت زیرجلدی و یا داخل عضلانی تزریق کنید.
سگ‌ها واکسن دوم را باید به فاصله ۳ هفته از واکسن اول دریافت کنند. به منظور جلوگیری از تداخل آنتی‌بادی مادری با ایمنی ایجاد شده توسط واکسن، سگ‌های واکسینه شده کمتر از ۹ هفته باید سه دوز از واکسن را با فواصل ۳ هفته دریافت کنند.
واکسیناسیون یادآور باید هر سال و به میزان یک دوز تکرار شود.