

ویتامین ث ۵۰٪ رویان®

Vitamin C 50%®

ROOYAN



ROOYAN  
DAROU

پودر قابل حل در آب

Water Soluble Powder

ویتامین و مکمل



۱۲ تا ۲۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب یا ۲۵ - ۲۰ گرم در ۱۰۰ کیلوگرم دان (معادل ۲۰ - ۱۵ میلی گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت ۳ روز.

بیماری های عفونی و انگلی ۲۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب یا ۴۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ کیلوگرم دان (معادل ۴۰ - ۳۰ میلی گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت ۳ روز.

#### زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

#### موارد احتیاط:

از تماس مستقیم پوست با فرآورده در زمان استفاده خودداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

#### شرایط نگهداری:

در جای خشک و زیر ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

#### بسته بندی:

پاکت ۱ کیلوگرمی

#### ترکیبات:

هر یک کیلوگرم محتوی ۵۰۰ گرم ال اسکوربیک اسید می باشد.

#### موارد مصرف:

۱ - در مواقع استرس ناشی از گرما و سرمای شدید، استرس حمل و نقل، استرس ناشی از تغییرات ناگهانی جیره، استرس زمان شروع تولید و پیک تولید در طیور تخمگذار و مادر، استرس واکسیناسیون، استرس ناشی از بیماری ها.

۲ - بهبود جذب و مصرف آهن، سلنیوم، کروم و مس  
۳ - کمک به سلامت پوست و جلوگیری از شکنندگی و ضعف رگ های خونی با علائم خون ریزی که ممکن است در زیر پوست ظاهر شود.

۴ - کاهش تحریک مخاط دستگاه تنفس در هنگام گرد و غبار داخل سالن، مشکلات تنفسی غیراختصاصی، عفونت ها خصوصا عفونت های ویروسی

۵ - کمک به استحکام پوسته

#### مقدار و نحوه مصرف:

استرس ناشی از درجه حرارت، استرس تولید در طیور تخمگذار، استرس ناشی از تغییرات در سالن ۱۲-۶ گرم در ۱۰۰ لیتر آب یا ۲۰ - ۱۰ گرم در ۱۰۰ کیلوگرم دان (معادل ۱۵-۱۰ میلی گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت ۳ روز.

استرس ناشی از واکسیناسیون یا نوک چینی، شوک گرمایی یا سرمای و موارد مشابه: