



محلول استریل تزریقی
Injectable solution

zoetis (Pfizer) تهیه شده از مواد اولیه شرکت

این دارو در درمان پیومتر و انومتریت بسیار موثر می باشد.

القای سقط جنین و خاتمه دادن به آبستنی:

دینوپروست را می توان برای ایجاد سقط جنین در مواردی مانند مومنیابی شدن جنین، مرگ جنین و آبستنی های ناخواسته استفاده نمود. بدین صورت که با تزریق از هفته اول بعد از جفت گیری تا ماه پنجم آبستنی می توان به آبستنی خاتمه داد و زایمان را القاء نمود.

ایجاد زایمان:

با یک ذر تزریق بعد از روز ۲۷۰ آبستنی می توان زایمان را القاء نمود.

مقدار و نحوه مصرف:

در درمانی برای هر راس گاو (گاو ماده و تلیسه) ۵ میلی لیتر (۲۵ میلی گرم دینوپروست) به صورت تجویز داخل عضلانی می باشد.

در درمانی برای هر راس اسب ۱ میلی لیتر (۵ میلی گرم دینوپروست) به صورت تجویز داخل عضلانی می باشد.

موارد منع مصرف:

دینوپروست در حیواناتی که از بیماری های تنفسی، گوارشی و نارسایی سیستم گردش خون رنج می برند منع مصرف دارد.

تداخل دارویی:

از تجویز هم زمان این دارو با داروهای خسدالتهاب غیراسترتوییدی اجتناب گردد.

عوارض جانبی:

این عوارض ممکن است ۱۵ دقیقه بعد از تزریق شروع شده تا حدود یک ساعت بعد فروکش نماید.

عوارض احتمالی عبارت است از:

اسپ: کولیک، تعریق، افزایش ضربان قلب و افزایش تنفس، کاهش درجه حرارت رکتان

گاو: در مواردی باعث کم شدن ترشح بزاق، افزایش تنفس و درجه حرارت رکتان می شود.

خانم های باردار و افرادی که مبتلا به بیماری آسم می باشند از تماس با این دارو اجتناب کنند.

در صورت تماس دارو با پوست فوراً آب و صابون شستشو داده شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۲۴ ساعت

شیر: مطற نمی باشد.

شرایط نگهداری:

دارو در دمای بین ۱۵-۳۰ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری می شود.

بسته بندی: ویل های ۱۰ و ۲۰ میلی لیتری

زد- دینو پی جی

Z-Dino PG®

دینوپروست تروماتامین
Dinoprost tromethamine



تربیب:

هر میلی لیتر از محلول حاوی ۵ میلی گرم ماده دینوپروست تروماتامین می باشد.

مکانیسم اثر:

پروستاگلاندین به عنوان یک ماده بیولوژیک فعال تقریباً در پیشتر قسمت های بدن حیوانات یافت می شود. پروستاگلاندین

F2 α یک هورمون لوتوپلیتیک است که باعث از بین رفتن جسم زرد می شود.

موارد مصرف:

ایجاد فحلی: با تزریق دینوپروست در گاو ماده غیر آبستن (شیری یا گوشتشی) دارای جسم زرد فال، عالیم فحلی ۲ تا ۵ روز بعد نمایان می شود.

همزمان سازی فحلی:

۱- دو تزریق به فاصله ۱۱ تا ۱۲ روز و تلقیح ۷۲ تا ۹۶ ساعت بعد از تزریق دوم

۲- استفاده در برنامه های همزمان سازی فحلی به همراه آنالوگ های GnRH

فحلي خاموش:

دینو پروست برای درمان گاو های ماده غیر آبستن که دارای جسم زرد فال بوده اما عالیمی مشخصی از فحلی ندارند، استفاده می شود. بعد از اولین تزریق و تحلیل جسم زرد عالیم فحلی ۲ تا ۵ روز بعد ظاهر می شود. در صورت عدم

بروز فحلی، تزریق دوم ۱۱ روز بعد تکرار می شود.

درمان کیست لوئال:

تزریق دینوپروست باعث تحلیل کیست لوئال تخدمان و بازگشت روند فعالیت طبیعی تخدمان می گردد.

درمان عفونت های رحمی:

تزریق دینوپروست به همراه یک آنتی بیوتیک مناسب در درمان عفونت های حاد و مزمن رحمی به کار می رود.

دینوپروست به طور قابل توجهی باعث بیشتر شدن فعالیت طبیعی دفع رحم در بهبود التهاب و عفونت رحمی می شود.