

لینکومایسین ۴۰% Lincomycin 40%



پودر قابل حل در آب
Water Soluble Powder

ROOYAN
DAROU

تهییه شده از مواد اولیه شرکت zoetis



رویان دارو

تداخل دارویی:

تحمیز همزمان لینکومایسین با ماکرولیدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارویی می‌گردد.

ترکیب:

هر گرم حاوی ۴۰۰ میلی گرم لینکومایسین فعال می‌باشد.

مکانیسم اثر:

لینکومایسین یک آنتی‌بیوتیک لینکوزامیدی و باکتریوستاتیک یوده که با اتصال به تحت واحد ۵-S-ریبوزومی از سنتر پروتئین‌های باکتری جلوگیری می‌کند و با مکانیسم فوق بر روی باکتری‌های گرم مثبت مانند استریتکوک‌ها، استافیلوکوک‌ها، کلستریدیوم‌ها و همچنین مایکوپلاسمها موثر می‌باشد.

موارد مصرف:

جهت درمان بیماری آنتریت نکروتیک (ورم روده نکروتیک) ناشی از کلستریدیوم پرفیرینژنس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بسته‌بندی:

سашه ۷۵ گرمی

مقدار و روش مصرف:

جهت درمان آنتریت نکروتیک ۷۵ گرم در ۱۰۰۰ آب آشامیدنی (معادل ۳۰ میلی گرم لینکومایسین در ۱ لیتر آب) به مدت حداقل ۷ روز تجویز می‌گردد.

موارد منع مصرف:

صرف در طیور مادر، تخمگذار و بوقلمون منع شده است.