



50 & 100 ml
Injectable solution

فقط برای مصرف دامپزشکی

Closantel 10%

محلول استریل تزریقی

کلوزانتل ۱۰٪

جلدی جهت از بین بردن بند پایان انگلی نظیر هیپودرما بویس و هیپودرمالینیاتوم.

گوسفند:

الف) ۱ میلی لیتر برای هر ۴۰ کیلوگرم وزن بدن دام (معادل ۲/۵ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت زیر جلدی جهت از بین بردن بین بردن از وفاگوستوموم رادیاتوم، همونکوس کنتورتوس، همونکوس پلاستی و استروس اویس.

ب) ۱ میلی لیتر برای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن دام (معادل ۵ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت زیر جلدی جهت از بین بردن فاسیولاهپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا، شابر تیا اویتا.

موارد منع مصرف:

همراه با سایر داروهای ضد انگل، ترکیبات دارویی حاوی کلر و فسفر آبی، مصرف نگردد.

در صورت سابقه ی بروز هر گونه حساسیت به ماده موثره و مواد جانبی این دارو، از مصرف آن پرهیز شود.

تجویز محلول ۱۰٪ کلوزانتل در گاوهای شیرده ای که شیر آن ها به مصرف انسان می رسد، ممنوع است.

عوارض جانبی:

ممکن است در محل تزریق باعث درد و لنگش شود که ۲ الی ۳ روز بعد، به خودی خود بهبود خواهد یافت.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۲۸ روز

شیر: مصرف این دارو در دام های شیرده که شیر آنها به مصرف انسانی خواهد رسید ممنوع می باشد.

موارد احتیاط:

بدون دستور دامپزشک تجویز نگردد.

بیش از مقدار تجویز شده تزریق نگردد.

شرایط نگهداری:

دور از نور و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

در دمای بالای ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری نشود.

از یخ زدگی محافظت شود.

پس از استفاده و وارد نمودن سوزن به داخل ویال در صورت نگهداری در دمای ۲ تا ۸ درجه سلسیوس تا ۲۸ روز بعد، می توان از ویال داروی مصرف شده استفاده نمود.

بسته بندی:

ویال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری



کلوزانتل ۱۰٪ (محلول استریل تزریقی)

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول حاوی ۱۰۰ میلی گرم کلوزانتل سدیم می باشد.

حیوان هدف: گاو و گوسفند

مکانیسم اثر:

کلوزانتل یک ترکیب سالیل آنالاید (Salilanalide) است که برای کنترل و درمان فلوک های نابالغ و نارس، نماتودها و مراحل لاروی بسیاری از بندپایان استفاده می شود. کلوزانتل از طریق مداخله در متابولیسم انرژی اثر می گذارد. این اثر از طریق باند نشدن و فسفوریلاسیون در زنجیره انتقال انرژی اکسیداتیو می باشد. علاوه بر این مکانیسم های دیگری هم مانند مداخله در گلیکولیز و کاهش ATP سلولی می توانند اثر کلوزانتل را تشدید نمایند.

موارد مصرف:

کلوزانتل برای درمان و کنترل آلودگی های انگلی ناشی از ترماتودها (فلوک) نظیر فاسیولاهپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا و نیز آلودگی های انگلی ناشی از نماتودها نظیر همونکوس کنتورتوس، همونکوس پلاستی، گونه های بونوستوموم و از وفاگوستوموم استفاده می شود. همچنین بر روی لارو برخی از بندپایان انگلی نظیر هیپودرما بویس، هیپودرما لینیاتوم، استروس اویس و لوسیلیا کوپرینا موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

گاو:

الف) ۱ میلی لیتر برای هر ۴۰ کیلوگرم وزن بدن دام (معادل ۲/۵ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت عضلانی یا زیر جلدی، جهت از بین بردن فلوک نظیر فاسیولاهپاتیکا و ژیکانتیکا، همونکوس کنتورتوس، همونکوس پلاستی، بونوستوموم فلبوتوموم و از وفاگوستوموم رادیاتوم

ب) ۱ میلی لیتر برای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن دام (معادل ۵ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت عضلانی یا زیر