

واکسن آنفلوانزای فوق حاد هاربین (H5)

Harbin Avian Influenza Inactivated Vaccine (H5)

واکسن غیر فعال آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تحت تیپ H5 ، (سویه های Re-6 و Re-8)
Inactivated Avian Influenza Vaccine H5 subtype, (strain Re-6 + strain Re-8)

ترکیبات:

حاوی ویروس آنفلوانزای پرندگان H5N1 از سویه های Re-6 با تیترا همگلوتیناسیون حداقل 9Log_2 و Re-8 با تیترا همگلوتیناسیون حداقل 8Log_2

موارد مصرف:

برای پیشگیری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تحت تیپ H5

نحوه مصرف:

تزریق عملانی در عضله سینه یا تزریق زیر جلدی در ناحیه گردن

میزان مصرف:

مرغ: دو نوبت* در سنین ۲-۵ هفته $0/3$ میلی لیتر، سنین بالای ۵ هفته $0/5$ میلی لیتر
اردک: دو نوبت* در سنین ۲-۵ هفته $0/5$ میلی لیتر، سنین بالای ۵ هفته ۱ میلی لیتر
غاز: دو نوبت* در سنین ۲-۵ هفته $0/5$ میلی لیتر، سنین بالای ۵ هفته $1/5$ میلی لیتر
* بین نوبت اول و دوم تزریق، حداقل ۴ هفته فاصله باشد.

عوارض جانبی:

مشاهده نشده است.

هشدار:

- ۱- طیور مبتلا به بیماری آنفلوانزا پرندگان و طیور بیمار نباید واکسینه شوند.
- ۲ - از یخ زدن واکسن پرهیز گردد.
- ۳- در صورت مشاهده شکستگی فلاکن واکسن، وجود جسم خارجی داخل آن و یا چند فازی شدن آن از مصرف واکسن خودداری گردد.
- ۴ - باید قبل از مصرف، واکسن به دمای عادی رسیده و بخوبی تکان داده شود.
- ۵ - از تجهیزات استریل جهت تزریق واکسن استفاده شود و سرسوزن به موقع تعویض گردد.
- ۶- در صورت باز شدن فلاکن واکسن، باید واکسن در همان روز مصرف گردد.
- ۷ - واکسن ۲۸ روز قبل از سن کشتار، مصرف نگردد.
- ۸- فلاکن های واکسن مصرف شده، ظروف و واکسن های نیمه مصرف شده باید به دقت پاک سازی گردند.

بسته بندی:

بطری ۲۵۰ میلی لیتری ۵۰۰ دوزی

تاریخ انقضا و دمای نگهداری:

۱۲ ماه پس از تولید، در دمای ۸- ۲ درجه سلسیوس نگهداری شود.

تولید کننده:

شرکت بیوتکنولوژی هارواک هاربین کشور چین

وارد کننده:

شرکت داروسازی رویان دارو

