



50 ml
Injectable solution

فقط برای مصرف دامپزشکی

Pramiject®

Injectable solution

Metoclopramide 0.5%

پرامیجکت®

موارد مصرف:

تحریک تخلیه دستگاه گوارش
افزایش عبور مواد غذایی از روده کوچک
کاهش تهوع
افزایش حرکات شیردان و شکمبه
کاهش اتساع و ریفلکس مری در اسب
افزایش حرکات روده در ایلئوس ناشی از هیپوکسی نوزادان
در کره اسب و یا فلجی روده بعد از جراحی

مقدار و نحوه مصرف:

اسب:
بصورت تزریق عضلانی
مقدار ۰/۳ تا ۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام در
دوز اولیه سپس در صورت نیاز روزانه ۲ بار تکرار شود.
سگ و گربه:
بصورت تزریق عضلانی
مقدار ۰/۵ تا ۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام
تجویز گردد.

موارد احتیاط:

در صورت تغییر رنگ دارو، از مصرف آن خودداری کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری
شود.
از یخ زدگی دارو جلوگیری شود.

بسته بندی:

ویال ۵۰ میلی لیتر



متوکلوپرامید ۵/۰٪ (محلول استریل تزریقی)

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول حاوی ۵ میلی گرم متوکلوپرامید
هیدروکلراید می باشد.

حیوان هدف: سگ، گربه و اسب

مکانیسم اثر:

این دارو بر روی دستگاه گوارش و سیستم اعصاب مرکزی عمل
می کند.

اثرات متوکلوپرامید بر سیستم اعصاب مرکزی (CNS):

متوکلوپرامید آنتاگونیست دوپامین بوده و با مسدود کردن
گیرنده های دوپامین در CNS موجب اثرات آرام بخشی و
ضد تهوع می شود.

اثرات متوکلوپرامید بر دستگاه گوارش:

این دارو بدون تاثیر بر ترشح آنزیم های پانکراس و صفراوی
سبب افزایش تون و دامنه انقباضات قسمت فوقانی دستگاه
گوارش، شل کردن اسفنکتر پیلور، افزایش حرکات دودی
دئودنوم و ژژنوم، کاهش چشمگیر مدت زمان تخلیه معده و
برقراری عبور مواد در روده می گردد. متوکلوپرامید تاثیر کمی
بر قسمت پایینی دستگاه گوارش دارد.

علاوه بر این متوکلوپرامید فشار اسفنکتر پایینی مری را افزایش
داده و باعث جلوگیری و یا کاهش ریفلکس معدی - مری
می گردد. اعمال فوق باعث اثر ضد تهوع دارو می گردد.