



# واکسن LSD-NDOLL

## واکسن زنده تخفیف حدت یافته علیه بیماری لامپی اسکین در گاو

### ترکیب:

هر دوز واکسن (۲ میلی لیتر) شامل حداقل مقادیر زیر می باشد:  
 سویه نیتلینگ LSD تخفیف حدت یافته  $10^{3.5}$  TCID<sub>50</sub>  
 لاکتالبومین هیدرولیزات 0.25 mg  
 سوکروز 0.5 mg



### حیوان هدف: گاو

### موارد استفاده:

واکسن LSD-NDOLL برای ایجاد ایمنی فعال در گاوها علیه بیماری لامپی اسکین می باشد. ایمنی فعال ۲۱ روز بعد از واکسیناسیون ایجاد می شود.

### مقدار و نحوه مصرف:

دوز مصرف ۲ میلی لیتر می باشد که به صورت زیر پوستی تزریق می شود. به منظور آماده سازی، ابتدا حجم مناسبی از حلال را به ویال لیوفیلیزه حاوی واکسن اضافه کرده به آرامی تکان دهید تا حل شود، سپس مخلوط آماده شده را به ویال حلال اضافه کرده به خوبی تکان داده و استفاده کنید. واکسن آماده شده باید ظرف ۲ ساعت مصرف شود.

### اثرات جانبی:

ممکن است بعد از واکسیناسیون افزایش مختصر دمای بدن در بعضی از حیوانات رخ دهد. تورم سفت یا نرمی به قطر ۵/۵-۵/۲ سانتیمتر و پوسته های نکروتیک خشکی ممکن است در سطح پوست محل تزریق مشاهده شود.

### موارد احتیاط:

حیوانات آلوده و حیوانات در دوره کمون بیماری نباید واکسینه شوند. ایمنی این واکسن در گاوهای آبستن هنوز مشخص نیست. به منظور جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی، واکسن در ۳ هفته آخر آبستنی استفاده نشود. باید دقت شود تا در حین واکسیناسیون از آلودگی چشم ها و دست واکسیناتور با واکسن جلوگیری شود. در صورت آلودگی، با آب فراوان شستشو داده و ضدعفونی گردد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. همه ویال های استفاده شده باید بعد از ۱۰ دقیقه جوشاندن، معدوم گردند.

### شرایط نگهداری:

در دمای یخچال (۸-۲ درجه سلسیوس) و در جای تاریک نگهداری شود. از یخ زدگی جلوگیری شود.

### تولید کننده:

شرکت دلوت، کشور ترکیه

### وارد کننده:

شرکت داروسازی رویان دارو



شرکت داروسازی رویان دارو

تلفن: ۵۷۸۰۳۰۰۰

www.rooyandarou.com

