

# Marek VAC Bivalent Frozen

## واکسن دوگانه زنده و منجمد شده بیماری مارک

### مشخصات:

واکسن Marek VAC Bivalent Frozen از هرپس و ویروس مرغی (Rispens) و بوقلمونی (HVT) رشد داده شده در کشت سلول فیبروبلاست حاصله از تخم مرغ جنین دار SPF تولید شده است. این دو سویه ویروس همراه با سلول در نیتروژن مایع (۱۹۶- درجه سلسیوس) منجمد و ذخیره می شوند.

تنها یک نوبت واکسیناسیون که به خوبی در روز های اولیه زندگی مورد استفاده قرار گیرد جهت ایجاد ایمنی پرنده کفایت خواهد کرد. ایمنی بعد از ۱۵ روز از زمان استفاده واکسن به حد مطلوب محافظت کننده، خواهد رسید.

به منظور جلوگیری از مواجهه زود هنگام با ویروس بیماری مارک و دستیابی به نتایج مفید واکسن در صورت امکان بهتر است پرنده طی ۲ تا ۳ هفته اول زندگی در محیطی تمیز و ضد عفونی قرار گیرد و به صورت مشخص در تماس با پرندگان مسن تر قرار نگیرد.

### ترکیبات:

یک دز واکسن شامل بیش از ۱۵۰۰ PFU برای هر سویه است.

### موارد مصرف:

پیشگیری از بیماری مارک

### میزان و روش مصرف:

یک ویال واکسن را از کیسول نیتروژن مایع خارج و در آب ولرم (بالای ۲۵ درجه سلسیوس) قرار دهید تا به صورت کامل ذوب شود. به وسیله یک سرنگ استریل محتوی ویال را در ظرف حاوی رقیق کننده و از قبل گرم شده ریخته و سپس مجدداً به وسیله یک میلی لیتر رقیق کننده، محتوی باقی مانده داخل ویال را شستشو دهید. محتوی ظرف را به خوبی

تکان داده، حالا واکسن آماده مصرف می باشد.

واکسن Marek VAC Bivalent Frozen تنها یک بار، با دز ۰/۲ میلی لیتر برای هر پرنده و به روش تزریق داخل عضلات ران و یا زیر جلد کردن باید مورد استفاده قرار گیرد. سن توصیه شده برای واکسیناسیون ۱ تا ۲ روزگی می باشد.

### توجه:

از زمان ذوب و رقیق شدن واکسن، محتویات می باید حداکثر طی ۲ ساعت مصرف شود. واکسن و ویال رقیق کننده باید بعد از مصرف سوزانده و یا ضد عفونی شود.

### شرایط نگهداری:

در نیتروژن مایع (۱۹۶- درجه سلسیوس) نگهداری شود.

### تاریخ انقضا:

۱۸ ماه

### بسته بندی:

ویال ۱۰۰۰ دزی به همراه رقیق کننده

ویال ۲۰۰۰ دزی به همراه رقیق کننده

### تولیدکننده:

شرکت FATRO ایتالیا



وار دکننده: شرکت داروسازی رویان دارو

تلفن: ۰۴-۸۸۹۳۷۴۳۳۳ فاکس: ۸۸۹۶۵۹۵

www.rooyandarou.com

