



500, 1000 & 4000 ml
Oral Suspension

فقط برای مصرف دامپزشکی

Ivermectin 0.1% + Triclabendazole 5%

سوسپانسیون خوراکی

آیورمکتین ۰/۱٪ + تریکلابندازول ۵٪



آیورمکتین ۰/۱٪ + تریکلابندازول ۵٪
(سوسپانسیون خوراکی)

ترکیب: هر میلی‌لیتر از سوسپانسیون خوراکی آیورمکتین و تریکلابندازول دارای یک میلی‌گرم آیورمکتین و ۵۰ میلی‌گرم تریکلابندازول می‌باشد.

حیوان هدف: گوسفند بالای ۳ ماه

مکانیسم اثر: این ترکیب حاوی آیورمکتین بوده که از گروه ماکروسایکلک لاکتون بوده و روی طیف گسترده ای از انگل‌های گرد و انگل‌های خارجی موثر است و دیگری تریکلابندازول از گروه بنزیمیدازول‌ها می‌باشد. ترکیب این دو ضد انگل نسبت به زمانی که به صورت تکی استفاده می‌شوند طیف اثر گسترده‌تر و اثربخشی قویتری ایجاد می‌نماید. آیورمکتین با تداخل در گیرنده‌های GABA و آن هم از طریق فعال شدن دروازه ورود یون‌های کلراید به داخل سلول Post synaptic باعث دپلاریزاسیون وسیع و غیرقابل بازگشت در سلول شده که موجب مرگ انگل می‌شود.

تریکلابندازول به عنوان کشنده فلوک کبدی یا Flukicide شناخته می‌شود. این ترکیبات با اتصال به بتا توبولین، باعث دپلیمریزاسیون سلولی می‌شوند. در چنین حالتی همه فرآیندهای سلولی مرتبط با بتاتوبولین مختل شده و مرگ انگل را سبب می‌شود.

موارد مصرف:

درمان آلودگی‌های انگلی ترکیبی ناشی از نماتودها، فلوک‌ها و بندپایان (انگل‌های گرد گوارشی، انگل‌های ریوی، فلوک کبدی و مگس لارو بینی)

نماتودهای دستگاه گوارشی (بالغ و نابالغ)

فلوک‌های کبدی (بالغ، نابالغ و مراحل اولیه لاروی کمتر از یک هفته) لارو مگس بینی (همه مراحل): استروس اویس

مقدار و نحوه مصرف:

یک میلی‌لیتر به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن (معادل ۰/۲ میلی‌گرم آیورمکتین و ۱۰ میلی‌گرم تریکلابندازول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) که از طریق شربت خوران به دام خورانده می‌شود. برای تجویز دوز صحیح بهتر است حیوانات را توزین نموده و شربت خوران نیز قبل از مصرف کنترل گردد. چنانچه حیوانات به صورت گروهی درمان می‌شوند، بهتر است گروه درمان شونده به خوبی توزین گردند تا از افزایش دوز دارو جلوگیری گردد.

عوارض مسمومیت با مصرف ۵ برابر دوز توصیه شده، مشاهده نشده است.

موارد منع مصرف: این دارو در مواردی که حساسیت نسبت به هر یک از مواد اولیه و یا جانبی مشاهده شود، منع مصرف دارد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشا: ۲۷ روز

شیر: در میش‌هایی که شیر آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود. این موضوع برای دوره خشکی هم صادق می‌باشد.

موارد احتیاط: از تماس مستقیم محصول با پوست و چشم خودداری شود.

در زمان استفاده، از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن خودداری شود.

در زمان تجویز مستقیم این محصول از دستکش‌های غیر قابل نفوذ استفاده گردد.

بعد از استفاده حتماً دست‌ها را شستشو دهید.

مقاومت به دارو حتماً در نظر گرفته شود، به همین منظور شمارش تخم‌های انگل هر از چندی بررسی شود. در صورت تایید مقاومت به دارو، باید از یک ضدانگل از یک گروه دارویی دیگر و با مکانیسم اثر متفاوت استفاده شود.

این ترکیب برای ماهی و سایر آبزیان خطرناک است.

از آلودگی منابع آبی با این محصول جلوگیری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در دمای زیر ۲۵ درجه سلسیوس و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

بسته بندی: ظروف نیم، یک و چهار لیتری



تولید کننده: شرکت داروسازی رویان دارو

ایران - سمنان، شهرک صنعتی شرق سمنان

تلفن: ۴ - ۸۸۹۳۷۴۳۳ (۰۲۱) www.rooyandarou.com