



20&50 ml
Injectable solution

فقط برای مصرف دامپزشکی

Zeleject®

Injectable solution

Florfenicol 40% + Meloxicam 0.5%

زل جکت®

محلول استریل تزریقی

می شود.
- تزریق فقط باید در ناحیه گردن انجام گیرد.
- بیشتر از ۱۵ میلی لیتر در یک ناحیه تزریق نشود.
- ممکن است تورم در محل تزریق ایجاد شود که به مرور زمان از بین می رود.
توصیه می شود که حیوانات در مراحل اولیه بیماری درمان شوند و پاسخ به درمان ۷۲ ساعت بعد ارزیابی گردد.
در صورت عدم کاهش علایم تنفسی و یا تشدید بیماری نسبت به تغییر دارو اقدام گردد.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: ۵۶ روز

در دام های شیرده که برای مصرف انسانی شیر تولید می کنند، مصرف نشود.
موارد منع مصرف:
مصرف در حیواناتی که قبلاً به فلورفنیکل یا ملوکسیکام افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است.
مصرف در گاوهای ماده بالای ۲۰ ماهه به دلیل نزدیک بودن به مرحله شیرواری توصیه نمی شود.
در گاوهای شیری در طول شیرواری و دوره خشکی استفاده نشود.
بیشتر از دوز توصیه شده مصرف نشود.

موارد احتیاط:
از تماس مستقیم با پوست، چشم و لباس ها جلوگیری شود.
در صورت تماس اتفاقی با چشم، به مدت ۱۵ دقیقه با آب بشویید.
در صورت تماس با پوست با آب و صابون شسته شود.
در صورت تزریق ناگهانی به انسان، سریعاً به پزشک مراجعه شود.
همزمان با سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و کورتیکوسترئیدها استفاده نشود.

در حیوانات مشکوک به زخم های گوارشی یا نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود.
اثرات فلورفنیکل روی عملکرد تولید مثلی، آبستنی و شیرواری بررسی نشده است.
در حیوانات شدیداً دهیدراته، هیپوولمیک یا هیپوتانسو استفاده نشود زیرا خطر مسمومیت کلیوی را افزایش می دهد.
شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.
ظرف ۲۸ روز بعد از بازکردن دارو آن را مصرف نمایید.

پسته بندی:

ویال ۲۰ و ۵۰ میلی لیتری



فلورفنیکل ۴۰٪ + ملوکسیکام ۰۵٪ (محلول استریل تزریقی)

ترکیب:

هر میلی لیتر از ترکیب فلورفنیکل + ملوکسیکام حاوی ۴۰۰ میلی گرم فلورفنیکل و ۵ میلی گرم ملوکسیکام می باشد

حیوان هدف: گاو

مکانیسم اثر:

فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک باکتریوستات سنتتیک با طیف اثر گسترده علیه بسیاری از باکتری های گرم منفی و مثبت جدا شده از حیوانات اهلی می باشد.

فلورفنیکل با اتصال به تحت واحد ۵۰ ریبوزوم و جلوگیری از سنتز پروتئین باکتری اثر خود را اعمال می کند.

مطالعات آزمایشگاهی نشان داده که فلورفنیکل علیه پاتوژن های ایجادکننده بیماری تنفسی گاوها (BRD) نظیر مانهیمیا همولیتیکا و هیستوفیلوس سومنی اثر باکتریوسیدی دارد.

ملوکسیکام یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) با خواص ضد التهابی، آنتی آگزودایی (ترشعی)، ضد درد و ضد تب می باشد که این اثرات از طریق مهار سیکلواکسیژناز، فسفولیپاز و مهار سنتز پروستاگلندین ایجاد می گردد.

۶ ساعت پس از تزریق فلورفنیکل + ملوکسیکام کاهش تب سریعتری نسبت به درمان با فلورفنیکل به تنهایی مشاهده شده است.

موارد مصرف:

این محصول برای درمان بیماری تنفسی گاوها (BRD) ناشی از مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا، هیستوفیلوس سومنی، میکروارگانیزم های حساس به فلورفنیکل و تب ناشی از BRD استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

این محصول به صورت تک دوز زیرپوستی با دوز ۴۰ میلی گرم فلورفنیکل و ۰/۵ میلی گرم ملوکسیکام برای هر کیلوگرم وزن بدن (که برابر است با ۱ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن) توصیه