



100, 500, 1000,
2000 & 4000 ml
Oral Solution

فقط برای مصرف دامپزشکی

MegAmprol 20[®]

محلول خوراکی

Amprolium 20%

مگامپرول ۲۰[®]



آمپرولیوم ۲۰٪ (محلول خوراکی)
ترکیب:

هر میلی لیتر از محصول حاوی ۲۰۰ میلی گرم آمپرولیوم (هیدروکلراید) می باشد.

حیوان هدف:

طیور گوشتی، پولت های مادر و تخمگذار، مرغان مادر و بوقلمون مکانیسم اثر:

آمپرولیوم از لحاظ شکل ساختمانی مشابه تیامین بوده و به صورت آنتاگونیست رقابتی مانع استفاده ایمریا از تیامین شده و با اختلال در متابولیسم داخلی انگل باعث نابودی آن می گردد. آمپرولیوم بیشترین اثر را در سه روز اول چرخه زندگی ایمریا داشته و بر روی مروزوئیت ها و سایر مراحل چرخه زندگی ایمریا نیز موثر است. آمپرولیوم در سلول های اپیتلیال روده با اثر بر روی نسل اول شیزونت ها و جلوگیری از تمایز مروزوئیت ها و متوقف ساختن مراحل جنسی و هاگ گذاری اووسیست ها، فعالیت ضدکوکسیدیایی خود را اعمال می کند. ۹۰٪ از آمپرولیوم مصرف شده توسط طیور در روده ها باقی می ماند و در مدت ۴۸ ساعت به طور کامل از بدن دفع می گردد.

موارد مصرف:

آمپرولیوم ۲۰٪ به منظور پیشگیری و درمان کوکسیدیوز طیور به کار می رود و علیه طیف وسیعی از گونه های بیماریزای ایمریا شامل ایمریا تنلا، ایمریا آسرولینا، ایمریا ماکسیمیا، ایمریا برونٹی، ایمریا میتیس، ایمریا پره کوکس، ایمریا نکاتریکس در طیور، ایمریا آدنوئیدس، ایمریا مله آگریمیتیس، ایمریا گالوپاونیس و ایمریا مله آگریدیدس در بوقلمون موثر است. این دارو همچنین بر علیه هیستومونباز (سر سیاه) در بوقلمون و طیور موثر می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

۱۲۵ میلی لیتر از محلول را در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به خوبی حل کرده و به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز در اختیار گله قرار دهید.

در همه گیری های شدید ۲۵۰ میلی لیتر از محلول را در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی حل کرده، ابتدا به مدت ۳ تا ۵ روز و سپس درمان را با مقدار ۶۲/۵ میلی لیتر در ۲۰۰ لیتر آب به مدت یک تا دو هفته ادامه دهید.

موارد منع مصرف:

در طیور تخم گذاری که تولید آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

بهمراه سایر سایر ضد کوکسیدیوز های درمانی و نیز ترکیبات دارویی حاوی ویتامین ب کمپلکس استفاده نشود.

عوارض جانبی:

ندارد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در مدت ۲ ماه باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا ۲۴ ساعت باید مصرف شود.

با جیره هایی که حاوی مقادیر بالای کولین کلراید یا تیامین می باشند، مصرف نشود.

در صورت تماس با پوست یا چشم، محل تماس را با آب شستشو دهید.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

در دمای ۳۰-۱۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود. از یخ زدن محصول جداً خودداری شود.

بسته بندی:

بطری ۱۰۰، ۵۰۰ میلی لیتری، ۱، ۲ و ۴ لیتری



تولید کننده: شرکت داروسازی رویان دارو

ایران-سمتان، شهرک صنعتی شرق سمتان

www.rooyandarou.com

تلفن: ۵۷۸۰۳۰۰۰ (۰۲۱)