



**توجه:**

به مقادیر، روش ها و موارد مصرف مندرج در لیبل دارو دقت کنید. مسئولیت هرگونه عارضه ناشی از تجویز و یا استفاده خارج از موارد مندرج در لیبل دارو Extra-Label به عهده فرد مسئول درمان است.

**هشدارهای مهم:**

حمام کردن یا شامپو کردن حیوانات دو روز قبل یا بعد از درمان با محصول توصیه نمی شود.

بیش از دوز توصیه شده مصرف نکنید.

از تماس دارو با چشم حیوان خودداری کنید.

به طور مستقیم روی نواحی پوست آسیب دیده اسپری نکنید.

مطمئن شوید که حیوانات پس از درمان یکدیگر را لیس نمی زنند.

حیوانات تحت درمان را به مدت حداقل ۳۰ دقیقه پس از اسپری و تا زمانی که خز کاملا خشک شود، دور از آتش یا سایر منابع گرما و سطوحی که احتمالا تحت تاثیر اسپری الکل قرار می گیرند، نگهداری کنید.

این محصول می تواند باعث تحریک غشای مخاطی و چشم شود.

بنابراین باید از تماس محصول با دهان یا چشم خودداری شود.

اسپری را تنفس نکنید.

هنگام استفاده از سیگار کشیدن، نوشیدن و خوردن خودداری کنید.

فیپرونیل ممکن است بر موجودات آبی تاثیر منفی بگذارد.

سگ ها نباید به مدت ۲ روز پس از استفاده در آب شنا کنند.

**ترکیب:** هر میلی لیتر دارو حاوی ۲/۵ میلی گرم فیپرونیل است.

**حیوان هدف:** سگ و گربه

**موارد مصرف:**

درمان آلودگی به کک (Ctenocephalides spp) در سگ و گربه

درمان آلودگی به کنه (Rhipicephalus sanguineus)

و (Ixodes ricinus) در سگ و گربه

درمان آلودگی شپش گزنده در سگ (Trichodectes canis) و در

گربه (Felicola subrostratus)

به عنوان بخشی از یک استراتژی درمانی برای کنترل درماتیت آلرژیک

در اثر گزش کک

اثر حشره کشی در برابر آلودگی های جدید با کک های بالغ، بسته به

چالش های محیطی، تا ۶ هفته در گربه ها و تا ۳ ماه در سگ ها باقی می ماند.

این محصول بسته به سطح چالش محیطی، اثر کنه کشی پایدار تا ۴ هفته

در برابر کنه ها دارد.

**مقدار و روش مصرف:**

**روش مصرف:** پمپ اسپری برای استفاده خارجی

هر پمپ معادل ۰/۵ میلی لیتر در بطری ۱۰۰ میلی لیتری

هر پمپ معادل ۱/۵ میلی لیتر در بطری ۲۵۰ میلی لیتری

هر پمپ معادل ۳ میلی لیتر در بطری ۵۰۰ میلی لیتری

**مقدار مصرف:** به منظور پوشش مناسب دارو روی پوست حیوان ۳ تا ۶

میلی لیتر دارو برای هر کیلوگرم وزن (معادل ۷/۵ تا ۱۵ میلی گرم از

ماده ی موثره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، بسته به اندازه ی موی بدن

استفاده شود. مقدار مصرف ممکن است به ۶ تا ۱۲ پمپ برای هر کیلوگرم

وزن بدن (بطری ۱۰۰ میلی لیتری) یا ۲ تا ۴ پمپ (بطری ۲۵۰ میلی لیتری)

یا ۱ تا ۲ پمپ (بطری ۵۰۰ میلی لیتری) توصیه شود.

**بر اساس طول پوشش بدن:**

بطری ۱۰۰ میلی لیتری: ۴ تا ۸ درمان برای گربه ۴ کیلوگرمی، تا ۳ درمان

برای سگ ۱۰ کیلوگرمی

بطری ۲۵۰ میلی لیتری: ۲ تا ۴ درمان برای سگ ۲۰ کیلوگرمی

بطری ۵۰۰ میلی لیتری: ۲ تا ۴ درمان برای سگ ۴۰ کیلوگرمی

**روش استفاده:** برای بطری ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی لیتری نازل را تنظیم کنید.

سپس از فاصله ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتری روی بدن حیوان اسپری کنید. اسپری

بر خلاف جهت پوشش حیوان انجام شود و از نشستن دارو روی پوست

اطمینان حاصل کنید. حتما موهای بلند را طوری کنار بزنید تا اسپری روی

پوست بنشیند. برای درمان ناحیه سر خصوصا در گربه های جوان و

عصبی، ابتدا روی دستکش اسپری کنید و سپس روی پوست حیوان

بکشید. حیوان را خشک نکنید تا به صورت طبیعی پوست خشک شود.

**موارد منع مصرف:**

در حیوانات بیمار (بیماری های سیستمیک و تب) یا در حال نقاهت استفاده

نشود.

در خرگوش استفاده نشود، زیرا ممکن است عوارض جانبی و حتی مرگ

رخ دهد.

در موارد از دیاز حساسیت به ماده فعال یا هر یک از مواد کمکی استفاده

نشود.

**عوارض جانبی:**

در صورت لیس زدن موضع ممکن است ترشح بیش از حد بزاق مشاهده

شود.

واکنش های پوستی گذرا مانند خارش یا آکوپسی پس از مصرف گزارش

شده است.

ترشح بیش از حد بزاق، علائم عصبی برگشت پذیر (بیهووشی، افسردگی،

علائم عصبی)، استفراغ یا علائم تنفسی پس از مصرف مشاهده شده

است.

**مصرف بیش از مقدار توصیه شده:**

عوارض جانبی ممکن است در مصرف بیش از حد افزایش یابد.

در صورت مصرف بیش از حد دارو، درمان علامتی مناسب را شروع کنید.

**مصرف در آبستنی و شیردهی:** با احتیاط مصرف شود.

**فارماکولوژی دارو:**

فیپرونیل یک حشره کش و کنه کش از خانواده فینیل پیرازول است.

این ماده با مهار کمپلکس GABA، اتصال به کانال کلراید و در نتیجه

مسدود کردن انتقال بیش و پس سیناپسی یون های کلراید در سراسر

غشا، عمل می کند. این منجر به فعالیت کنترل نشده سیستم عصبی

مرکزی و مرگ حشرات و کنه ها می شود.

فیپرونیل فعالیت حشره کشی و کنه کشی را در برابر

کک ها (Ctenocephalides spp)،

کنه ها (Rhipicephalus spp، Ixodes spp)

و شپش ها (Trichodectes spp. and Felicola spp) در سگ

و گربه از خود نشان می دهد.

**شرایط نگهداری:**

به شدت قابل اشتعال است.

در دمای ۳۰-۱۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

محتویات ظرف بعد از شروع اولین استفاده به مدت ۱ ماه قابل استفاده

است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

**فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.**

**بسته بندی:** ظروف ۱۰۰ میلی لیتری با پمپ